

2024 届普通高等学校招生全国统一考试

青桐鸣高二联考

地 理


全卷满分 100 分,考试时间 90 分钟。

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 22 小题,每小题 2 分,共 44 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。


我国某中学地理研学小组利用周末的一天,采用旗杆观测日影的方法,估测学校所在的经度,并绘制了该日旗杆影子位置示意图(下图)。图中 C 为 A、B 两点的中点。据此完成 1~2 题。



1. 学校钟表时间为 12:20 时,旗杆影子与 OC 重合,推测当地的经度为 ()
A. 125°E B. 120°E C. 115°E D. 105°E
2. 观察发现,该日旗杆影子 ()
A. 日落时长于日出时
B. 日出与日落时等长
C. 日出时朝东北
D. 日落时朝西南


秘鲁查基洛 13 塔是秘鲁首都利马北部查基洛遗址中由 13 座矩形石塔组成的太阳观象台。13 座塔墩沿山脊南北呈齿状展开。13 个塔之间形成了 12 个间隔,构成 12 点位,12 个点位对应 12 个月。站在观察点上的人,会在不同时期观测太阳在不同石塔边缘的日出及日落情况。下图示意秘鲁查基洛 13 塔及东观测点位置。据此完成 3~5 题。

地理试题 第 1 页(共 8 页)



3. 东观测点主要观测的是 ()
 A. 升起的太阳 B. 落下的太阳 C. 正午太阳高度 D. 昼夜长短变化
4. 图中甲点位表示的是 ()
 A. 春分日日出 B. 夏至日日落 C. 秋分日日出 D. 冬至日日落
5. 当观测到的太阳位于乙点位时,当地昼夜状况是 ()
 A. 出现极昼现象 B. 昼渐长、夜渐短
 C. 昼、夜各长 12 小时 D. 昼夜长短差值最大


祁连山脉由多条西北—东南走向的平行山脉和宽谷组成,东西长 800 千米,海拔 4 000~6 000 米,共有冰川 3 306 条,面积约 2 062 平方千米。祁连山脉北部山麓分布着连绵的冲积扇,冲积扇是绿洲农业的主要分布区。下图示意祁连山脉及冲积扇分布。据此完成 6~8 题。



6. 图中发源于祁连山脉的河流,主要补给水源是 ()
 A. 大气降水 B. 高山冰雪融水 C. 地下水 D. 高山湖泊
7. 祁连山脉冲积扇分布于山前地带,其主要原因是山前 ()
 A. 风化强烈,风化物厚度大
 B. 植物茂密,地下水埋藏浅
 C. 地势变缓,河流流速慢
 D. 河流汇集,携带泥沙多
8. 祁连山山麓的绿洲农业适宜布局在 ()
 ①河流的出口 ②冲积扇的中部 ③冲积扇的下部 ④冲积扇的扇缘
 A. ①③ B. ②④ C. ①② D. ③④


地理试题 第 2 页(共 8 页)

受下垫面状况的影响,全球气压带、风带分布趋于复杂,并影响各地的天气与气候。下图示意南美洲部分区域某月海平面等压线分布。据此完成9~11题。



9. 图示月份所在的季节可能是 ()
- A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季
10. 图示海洋上的高气压形成于 ()
- A. 东南信风带 B. 副热带高气压带
- C. 盛行西风带 D. 副极地低气压带
11. 该月份,甲、乙两地的气候特点是 ()
- A. 气温日较差大 B. 高温多雨
- C. 飓风登陆频繁 D. 凉爽少雨


海南岛东部及四周为平原,中部、中西部为五指山山地。1月全岛盛行东北风,3~4月逐步转为东、东南、南风;6~7月东部仍为东南、南风;南部、西部则转为南、西南风;9~10月全岛又转为东北风。在不同月份的季风影响下海南岛年降水量空间差异较大。下图示意海南岛年等降水量线分布。据此完成12~14题。



12. 海南岛地处 ()
- A. 东亚季风环流的东部 B. 南亚季风环流的西部
- C. 东亚季风和南亚季风的过渡地带 D. 东亚季风和南亚季风的中心地带
13. 海南岛中部降水多于周边地区的主要影响因素是 ()
- A. 地形 B. 纬度 C. 海陆位置 D. 大气环流


14. 夏季,海南岛西南部受西南季风影响大,但降水较少,其原因是西南季风 ()
- A. 影响海南岛的时间短 B. 为中南半岛的离岸风
- C. 势力弱于东南季风 D. 跨海时的速度过快

在多种因素综合作用下,中国近海及附近海域的洋流具有明显的季节变化。下图示意某季节中国近海及附近海域洋流分布。据此完成 15~17 题。



15. 我国东部海域沿岸流的主要驱动力是 ()
- A. 东北信风 B. 盛行西风 C. 冬季风 D. 夏季风
16. 黑潮暖流的分支洋流形成的主导因素是 ()
- A. 密度差异 B. 海陆分布 C. 风向变化 D. 海表温度
17. 该季节,图示海域洋流对我国沿海气候的主要影响是 ()
- A. 增温增湿 B. 降温增湿 C. 增温减湿 D. 降温减湿

我国西北内陆地区自然环境独具特色。下图示意我国西北内陆地区自然环境各要素之间的关系。据此完成 18~20 题。




18. 该图反映的是自然地理环境的 ()
- A. 差异性 B. 区域性 C. 整体性 D. 综合性
19. 西北内陆地区的气候,为塑造风沙地貌提供的条件是 ()
- ①强烈的物理风化 ②显著的生物风化 ③风力的侵蚀、搬运与堆积 ④大面积地表裸露
- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

20. 形成西北内陆地区土壤特征的直接因素是 ()

- A. 气候 B. 地貌 C. 地质 D. 生物

我国是一个多山的国家,不同的山地形成了不同的垂直自然带谱。下图示意我国某山地垂直自然带谱图。据此完成 21~22 题。



21. 该山地可能位于我国 ()

- A. 暖温带湿润地区 B. 亚热带湿润地区
C. 温带半干旱地区 D. 热带半干旱地区


22. 次生草丛、灌木林带替代原生自然带的可能原因是 ()

- A. 全球气候变暖 B. 厄尔尼诺影响
C. 人类的过度放牧 D. 人类的过度砍伐

二、非选择题:本题共 4 小题,共 56 分。

23. 阅读图文材料,完成下列要求。(16 分)


四川省断层构造发育,地形复杂多样,山地、高原和丘陵约占全省面积的 97.46%。地形格局为东部是四川盆地及盆缘山地,西部是青藏高原东缘及川西南山地。下图示意四川省成都平原及以西地区断层构造及河流分布。



- (1)断层构造会影响山脉的形成、走向和分布,分析图示区域断层构造对山脉的影响。(6分)
- (2)阐释该区域西部断层构造与成都平原形成的关系。(6分)
- (3)指出该区域断层构造分布地带应当防御的地质灾害,并说明理由。(4分)

24. 阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

印度半岛是喜马拉雅山脉以南面积较大的半岛形陆地,是亚洲大陆的南延部分,又叫南亚次大陆。南亚次大陆的海陆分布对大气环流、气候、天气影响显著。下图示意某月印度半岛及附近区域海平面等压线分布。



- (1)图示月份,印度半岛在低气压控制下,分析低气压形成的原因。(6分)
- (2)推断在低气压控制下,印度半岛降水的空间差异,并说明理由。(6分)
- (3)指出该月份印度半岛的气候特点。(4分)

25. 阅读图文材料,完成下列要求。(14分)


陶波湖位于新西兰北岛中部火山高原上,面积 616 平方千米,是新西兰最大的湖泊。怀卡托河上游由南面注入,在陶波湖东北部流出。湖泊四周多地热温泉,或作疗养地,或用以发电。冬季,游客们可以在陶波湖中游泳,也可以泛舟。下图示意陶波湖位置。



- (1)简述面积辽阔的陶波湖的形成过程。(6分)
- (2)分析游客们在冬季的陶波湖中既可游泳,也可泛舟的原因。(4分)
- (3)阐释陶波湖与其他陆地水体之间的关系。(4分)

26. 阅读图文材料,完成下列要求。(10分)

拉尼娜是指赤道中、东太平洋海表温度异常,出现大范围偏冷、强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。国家气候中心最新监测结果显示,当前“拉尼娜”事件正在持续。下图为2022年10月太平洋海表温度距平分布(单位:℃)。图中显示热带中东太平洋大部海表温度较常年同期偏低。



(1)分析图中甲海域海气之间的相互作用。(6分)

(2)推测并说明乙海域海—气相互作用给澳大利亚东部带来的气象灾害。(4分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线