

高三数学试卷参考答案

1. B 因为存在量词命题的否定是全称量词命题,所以选 B.
2. B 因为 $3a+b=(\frac{3}{a}+\frac{1}{b})(3a+b)=10+\frac{3b}{a}+\frac{3a}{b}\geqslant 10+2\sqrt{9}=16$, 当且仅当 $a=4, b=4$ 时, 等号成立, 所以选 B.
3. A 因为 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ ($\omega>0, |\varphi|<\pi$) 是奇函数, 所以 $f(0)=\sin \varphi=0$, 所以 $\varphi=k\pi, k\in \mathbf{Z}$, 因为 $|\varphi|<\pi$, 所以 $\varphi=0$, 则 $f(x)=\sin \omega x, g(x)=\sin \frac{\omega x}{2}$. 由 $\frac{2\pi}{\frac{\omega}{2}}=2\pi$, 得 $\omega=2$, 所以 $f(\frac{\pi}{12})=\sin \frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$.
4. D 因为不等式 $ax^2+2ax-1<0$ 恒成立, 所以 $a=0$ 或 $\begin{cases} a<0, \\ 4a^2+4a<0, \end{cases}$ 所以 $-1<a\leqslant 0$, 以上各选项只有 $-1< a < 0$ 是 $-1< a \leqslant 0$ 的充分不必要条件, 故选 D.
5. C 因为 $f(-x)=\frac{2(-x)\sin(-x)}{(-x)^2+1}=f(x)$, 所以 $f(x)$ 是偶函数, 故而排除 A, B; 因为当 $0 < x < \pi$ 时, $f(x)=\frac{2x\sin x}{x^2+1}\leqslant \frac{2x\sin x}{2x}=\sin x\leqslant 1$, 所以 $f(x)<1$, 故选 C.
6. A 由题知曲线 $y=f(x)$ 关于点 $(1, 0)$ 对称, $y=-\frac{1}{x-1}$ 的图象也关于点 $(1, 0)$ 对称, 设函数 $g(x)=f(x)+\frac{1}{x-1}$ 的零点分别为 x_1, x_2 , 则 $\frac{x_1+x_2}{2}=1$, 所以 $x_1+x_2=2$.
7. D 令 $x=1, y=0$, 得 $2f(1)=2f(1)f(0)$, 又 $f(1)=\frac{1}{2}$, 所以 $f(0)=1$, 故 A 错误; 令 $x=0$, 得 $f(y)+f(-y)=2f(0)f(y), f(-y)=f(y)$, 所以 $f(x)$ 是偶函数, 故 B 错误; 令 $x=y=1$, 得 $f(2)=-\frac{1}{2}$, 所以 $f(-2)=-\frac{1}{2}$, 故 C 错误; 令 $y=1$, 得 $f(x+1)+f(x-1)=f(x)$, 又得 $f(x+2)+f(x)=f(x+1)$, 两式相加得 $f(x+2)+f(x-1)=0$, 即 $f(x+3)+f(x)=0, f(x+3)=-f(x)$, 所以 $f(x+6)=f(x)$, 即 $f(x)$ 的最小正周期是 6, 故 D 正确.
8. D 不等式 $t(\sqrt{x}+\sqrt{y})\leqslant \sqrt{2x+2y}$ 对所有的正实数 x, y 恒成立, 即 $t\leqslant \frac{\sqrt{2x+2y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ 对所有的正实数 x, y 恒成立. 因为 $x+y\geqslant 2\sqrt{xy}$, 所以 $2x+2y\geqslant x+2\sqrt{xy}+y=(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2$, 所以 $\sqrt{2x+2y}\geqslant \sqrt{x}+\sqrt{y}$, 则 $\frac{\sqrt{2x+2y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\geqslant 1$, 故 $t\leqslant 1$.
9. BD 因为 $A=\{x|x<-1 \text{ 或 } x>4\}, B=\{x|0<x<2\}$, 所以 $A\cap B=\emptyset, B\subseteq \complement_{\mathbf{R}} A$, B, D 正确, A, C 错误.

10. ACD 因为 $\alpha = \beta + \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \alpha = \sin(\beta + \frac{\pi}{2}) = \cos \beta$, A 正确.

因为 $2\sin^2 \alpha + \sqrt{3} \sin 2\alpha = 1 - \cos 2\alpha + \sqrt{3} \sin 2\alpha = 1 + 2\sin(2\alpha - \frac{\pi}{6})$, 所以 B 错误. 将方程 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{2}$ 两边平方, 得 $1 - \sin 2\alpha = \frac{1}{4}$, 解得 $\sin 2\alpha = \frac{3}{4}$, C 正确. 因为 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\tan \alpha = 2$, 则 $\tan(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{1+2}{1-1\times 2} = -3$, D 正确.

11. CD 设 $\omega x - \frac{\pi}{6} = t$, 因为 $x \in (0, \pi)$, 所以 $t \in (-\frac{\pi}{6}, \omega\pi - \frac{\pi}{6})$. 因为 $f(x)$ 有两个零点, 所以 $\pi < \omega\pi - \frac{\pi}{6} \leqslant 2\pi$, 即 $\frac{7}{6} < \omega \leqslant \frac{13}{6}$. 又因为 $f(x)$ 有两个极值点, $(\sin t)' = \cos t$, 所以 $y = \cos t$ 在 $(-\frac{\pi}{6}, \omega\pi - \frac{\pi}{6})$ 上有两个零点, 所以 $\frac{3\pi}{2} < \omega\pi - \frac{\pi}{6} \leqslant \frac{5\pi}{2}$, 即 $\frac{5}{3} < \omega \leqslant \frac{8}{3}$, 故 ω 的取值范围是 $(\frac{5}{3}, \frac{13}{6}]$.

12. BD ①若 $ab=1$, 则 $f(x)=a^x + \frac{1}{a^x} \geqslant 2$, 当且仅当 $x=0$ 时, 等号成立.

②若 $ab>1, a>b>0$, 则 $a>1$.

若 $b>1$, 则函数 $f(x)$ 单调递增, 它的值域为 $(0, +\infty)$, 与题意矛盾, 所以 $0 < b < 1$.

因为 $f(x)=a^x + b^x$, 所以 $f'(x)=b^x[\ln b + (\frac{a}{b})^x \ln a]$, 令 $g(x)=\ln b + (\frac{a}{b})^x \ln a$, 因为 $\frac{a}{b}>1, \ln a>0, \ln b<0$, 所以 $g(x)$ 单调递增, $g(0)=\ln(ab)>0$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) \rightarrow \ln b$,

所以存在 $x_0 \in (-\infty, 0)$, 使得 $g(x_0)=0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, 0)$ 上单调递增, 此时函数 $f(x)$ 的最小值 $f(x_0)<2$, 不符合题意.

③若 $ab<1, a>b>0$, 则 $0 < b < 1$.

若 $0 < a < 1$, 则函数 $f(x)$ 单调递减, 它的值域为 $(0, +\infty)$, 与题意矛盾, 所以 $a>1$.

因为 $\frac{a}{b}>1, \ln a>0, \ln b<0$, 所以由②知 $g(x)$ 单调递增, $g(0)=\ln(ab)<0$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) \rightarrow \ln b$,

所以存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $g(x_0)=0$, $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在区间 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 此时函数 $f(x)$ 的最小值 $f(x_0)<2$.

综上, 可知 $ab=1$, 因为 $a>b>0$, 所以 $a>1, 0 < b < 1$, 即 $a>1>b$.

13. $\frac{2}{5}$ 因为 $f'(x)=4f'(-1) \cdot x^3 + 2$, 所以 $f'(-1)=4f'(-1) \times (-1)^3 + 2$, 解得 $f'(-1)$

$$= \frac{2}{5}.$$

14. 2 因为 $(\tan \alpha - 1)(\tan \alpha + 3) = 0$, 且 α 是第三象限角, 所以 $\tan \alpha = 1$, 故

$$\frac{4\sin(\pi+\alpha)}{\cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)-\cos(-\alpha)} = \frac{-4\sin\alpha}{-\sin\alpha-\cos\alpha} = \frac{4\sin\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha} = \frac{4\tan\alpha}{\tan\alpha+1} = 2.$$

15. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 因为 $f'(x) = 2x - 1$, 所以 $f''(x) = 2$, 从而 $f'(1) = 1$, $f''(1) = 2$, 所以 $K = \frac{2}{(1+1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 65.5 由 $70=50\times(0.5+2^{-0.00004a})$, 得 $2^{-0.00004a}=0.9$, 所以当人口密度为 $2a$ 人/ km^2 时, 他的行车速度 $v=50\times[0.5+(2^{-0.00004a})^2]=65.5$ km/h.

17. 解:(1)因为 $U=\{2,3,4,5\}, A=\{3,4\}$, 2分

所以 $\complement_U A=\{2,5\}$ 3分

(2)因为 $(a^2+1)\in \complement_U A$, 所以 $a^2+1=2$ 或 $a^2+1=5$, 4分

解得 $a=\pm 1$ 或 $a=\pm 2$ 5分

又 $a\in U$, 所以 $a=2$ 6分

(3)若 $C=\{2\}$, 则 C 的真子集只有 1 个, 不符合题意. 8分

所以 $C=\{2,5\}$, 即 $m^2=5$, 解得 $m=\pm\sqrt{5}$ 10分

18. 解:(1)因为 $f(x)=x^3-ax^2-x$, 所以 $f'(x)=3x^2-2ax-1$, 1分

由 $f'(1)=2-2a=0$, 解得 $a=1$ 2分

$f(x)=x^3-x^2-x, f'(x)=3x^2-2x-1$ 3分

令 $3x^2-2x-1<0$, 得 $-\frac{1}{3}< x < 1$, 可知 $f(x)$ 在 $[-1, -\frac{1}{3}]$ 上单调递增, 在 $(-\frac{1}{3}, 1)$ 上单调

递减, 在 $[1, 2]$ 上单调递增, 4分

因为 $f(-\frac{1}{3})=\frac{5}{27}, f(2)=2$, 且 $\frac{5}{27}<2$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上的最大值为 2. 5分

(2)因为 $g(x)=4x+m$, 所以 $y=f(x)-g(x)=x^3-x^2-5x-m$,

设 $h(x)=x^3-x^2-5x$, 则 $h'(x)=3x^2-2x-5$,

令 $h'(x)>0$ 得 $x<-1$ 或 $x>\frac{5}{3}$, 令 $h'(x)<0$ 得 $-1<x<\frac{5}{3}$, 7分

所以 $h(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, -1), (\frac{5}{3}, +\infty)$ 上单调递增, 8分

所以 $h(x)$ 在 \mathbb{R} 上的极大值为 $h(-1)=3$, 极小值为 $h(\frac{5}{3})=-\frac{175}{27}$ 10分

又函数 $y=f(x)-g(x)$ 在 \mathbb{R} 上有三个零点, 所以函数 $h(x)=x^3-x^2-5x$ 与函数 $y=m$ 的图象有三个交点,

所以 $-\frac{175}{27}< m < 3$, 即实数 m 的取值范围为 $(-\frac{175}{27}, 3)$ 12分

19. 解:(1)因为质点 A, B 运动的角速度分别为 3 rad/s 和 5 rad/s,

所以 x s 时质点 A, B 的坐标分别为 $(\cos 3x, \sin 3x), (\cos 5x, \sin 5x)$, 3分

所以 $f(x) = \sqrt{(\cos 3x - \cos 5x)^2 + (\sin 3x - \sin 5x)^2} = \sqrt{2 - 2\cos 3x\cos 5x - 2\sin 3x\sin 5x}$,

即 $f(x) = \sqrt{2 - 2\cos 2x} = 2|\sin x| (x \geq 0)$ 6 分

(2) 因为两质点从点 P 出发后每次相遇对应函数 $f(x)$ 的一个零点,

所以 x_n 为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上第 n 个零点, 8 分

由 $f(x_n) = 2|\sin x_n| = 0$, 得 $\sin x_n = 0$, 10 分

所以 $x_n = n\pi (n \in \mathbb{N}^*)$ 12 分

20. 解:(1) 由题意可得 $27000a + 630 = 180$, 解得 $a = -\frac{1}{60}$ 2 分

当对甲项目投资 30 万元时, 对乙项目投资 170 万元,

则 $-2a(170-b)^2 = \frac{1}{30}(170-b)^2 = 120$, 解得 $b = 110$ 4 分

设对甲项目的投资金额为 x 万元, 则对乙项目的投资金额为 $200-x$ 万元,

则 $\begin{cases} x \geq 10, \\ 200-x \geq 10, \end{cases}$ 解得 $10 \leq x \leq 190$ 5 分

故 $f(x) = -\frac{1}{60}x^3 + 21x + \frac{1}{30}[(200-x)-110]^2 = -\frac{1}{60}(x^3 - 2x^2 - 900x - 16200) (10 \leq x \leq 190)$ 7 分

(2) 设 $h(x) = x^3 - 2x^2 - 900x - 16200 (10 \leq x \leq 190)$, $h'(x) = 3x^2 - 4x - 900 = (3x+50)(x-18)$ 8 分

当 $x \in [10, 18]$ 时, $h'(x) < 0$, 当 $x \in (18, 190]$ 时, $h'(x) > 0$,

则 $h(x)$ 在 $[10, 18]$ 上单调递减, 在 $(18, 190]$ 上单调递增, 则 $h(x)_{\min} = h(18) = -27216$ 10 分

故 $f(x)_{\max} = f(18) = 453.6$, 即对甲项目投资 18 万元, 对乙项目投资 182 万元, 才能使总收益 $f(x)$ 取得最大值 453.6 万元. 12 分

21. 解:(1) 因为函数 $y = \lg[g(x)]$ 的值域为 \mathbb{R} , 所以 $y = g(x)$ 的值域要包含 $(0, +\infty)$, 1 分

当 $m \leq 0$ 时, $\lg[g(x)] < \lg 3$, 不符合题意, 所以 $m > 0$ 2 分

$g(x) = m \cdot (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x + 3$, 令 $2^x = t (t > 0)$, $h(t) = mt^2 - 4t + 3$ 的值域要包含 $(0, +\infty)$, 3 分

所以 $\Delta \geq 0$, 即 $16 - 12m \geq 0$, 解得 $m \leq \frac{4}{3}$. 又因为 $m > 0$, 所以 $0 < m \leq \frac{4}{3}$ 4 分

因为 $m \in \mathbb{Z}$, 所以 $m = 1$ 5 分

(2) 因为 $f(x)$ 是定义域为 $(-2, 2)$ 的奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 即 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{a}{2} = 0$, 解得 $a = 2$ 6 分

又 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{2-x}{2+bx}$ 的定义域为 $(-2, 2)$, 所以 $\frac{2-x}{2+bx} > 0$ 的解集是 $(-2, 2)$, 即 $(x-2)(bx+2) < 0$ 的解集是 $(-2, 2)$, 解得 $b = 1$,

所以 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{2-x}{2+x} = \log_{\frac{1}{2}} (-1 + \frac{4}{2+x})$ 7 分

因为 $y = -1 + \frac{4}{2+x}$ 在 $(-2, 2)$ 上单调递减, 所以 $f(x)$ 在 $(-2, 2)$ 上单调递增, 8 分

所以 $\forall x_1 \in [1, 2], f(x_1) \geq f(1) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ 9 分

$\forall x_1 \in [1, 2], \exists x_2 \in [-1, 1], f(x_1) - g(x_2) > -\frac{1}{2}$, 即 $\exists x_2 \in [-1, 1], g(x_2) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$,
..... 10 分

即 $\exists x \in [-1, 1], m \cdot 4^x - 2^{x+2} + 3 < 1$, 即 $m < -2 \cdot [(\frac{1}{2})^x]^2 + 4 \cdot (\frac{1}{2})^x$.

令 $(\frac{1}{2})^x = u, u \in [\frac{1}{2}, 2]$, 即 $m < -2u^2 + 4u$.

因为 $-2u^2 + 4u = -2(u-1)^2 + 2 \leq 2$, 所以 $m < 2$, 即 m 的取值范围是 $(-\infty, 2)$ 12 分

22. (1) 解: 当 $a=1$ 时, $f(x) = e^x - 1 - x \ln x$, 1 分

则 $f'(x) = e^x - 1 - \ln x$, 2 分

$f'(1) = e - 1$, 3 分

$f(1) = e - 1$, 4 分

所以所求切线的方程为 $y = (e-1)x$ 5 分

(2) 证明: (法一) 当 $a \geq 1, x > 0$ 时, 要证 $f(x) + \cos x = a(e^x - 1) - x \ln x + \cos x > 0$, 只需证 $e^x - x \ln x + \cos x - 1 > 0$, 6 分

即要证 $(e^x - \frac{3}{2}x^2 + x) + (x^2 - x - x \ln x) + (\cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2) > 0$ 7 分

易证 $x - 1 \geq \ln x$, 即 $x^2 - x - x \ln x \geq 0$, 当且仅当 $x=1$ 时, 等号成立. 8 分

令 $\varphi(x) = \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2 (x > 0)$, 则 $\varphi'(x) = x - \sin x > 0$, 所以 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 即 $\cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2 > 0$ 9 分

因此, 只需证 $e^x - \frac{3}{2}x^2 + x \geq 0$ 对 $x > 0$ 恒成立.

令 $g(x) = e^x - \frac{3}{2}x^2 + x$, 则 $g'(x) = e^x - 3x + 1$, 10 分

令 $h(x) = e^x - 3x + 1$, 则 $h'(x) = e^x - 3$, $h(x)$ 在 $(0, \ln 3)$ 上单调递减, 在 $[\ln 3, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $h(x)_{\min} = 4 - 3\ln 3 > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) > g(0) = 1 > 0$ 11 分

故当 $a \geq 1$ 时, $f(x) + \cos x > 0$ 恒成立. 12 分

(法二) 要证 $f(x) + \cos x = a(e^x - 1) - x \ln x + \cos x > 0$, 由于 $a \geq 1, x > 0, e^x - 1 > 0$, 只需证 $e^x - 1 - x \ln x + \cos x > 0$ 6 分

当 $x \in (0, 1)$ 时, $e^x - 1 - x \ln x + \cos x > x + 1 - 1 - x \ln x + \cos x = x(1 - \ln x) + \cos x$ 8 分

因为 $1 - \ln x > 0, \cos x > 0$, 所以 $e^x - 1 - x \ln x + \cos x > 0$ 9 分

当 $x \in [1, +\infty)$ 时, 令 $F(x) = e^x - 1 - x \ln x$, 则 $F'(x) = e^x - 1 - \ln x > x - \ln x > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 则 $F(x) = e^x - 1 - x \ln x \geq F(1) = e - 1 > 1$,

所以 $e^x - 1 - x \ln x + \cos x > 1 + \cos x \geq 0$ 11 分

综上, $e^x - 1 - x \ln x + \cos x > 0$ 恒成立,

所以 $a(e^x - 1) - x \ln x + \cos x \geq e^x - 1 - x \ln x + \cos x > 0$, 即 $f(x) + \cos x > 0$ 12 分

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京, 旗下拥有网站 ([网址: www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)) 和微信公众平台等媒体矩阵, 用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长, 在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南, 请关注**自主选拔在线**官方微信号: **zizzsw**。



微信搜一搜

自主选拔在线