

兰州一中 2022-2023-2 学期高二年级期末考试

数学试题参考答案

一、单选题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 有且仅有一个选项符合题意；

二、多选题：9—12 题每题至少两个选项符合题意，多选不得分，少选得 2 分.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C	B	A	B	D	C	B	ABD	BD	ABD	BC

第 II 卷（非选择题 共 90 分）

三、填空题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.

13. 2 14. $e-1$ 15. $5\sqrt{5}$ 16. $[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 1)$

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.(本小题满分 10 分)

【解】(1) 设 A_1 表示“甲球员担当边锋”，

A_2 表示“甲球员担当前卫”，

A_3 表示“甲球员担当中场”，

A_1, A_2, A_3 两两互斥，

设 B 表示“球队赢了某场比赛”，

$$\text{则 } P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$= 0.5 \times 0.6 + 0.3 \times 0.8 + 0.2 \times 0.7 = 0.68,$$

该球队某场比赛获胜的概率为 0.68.

-----5 分

(2) 由(1)知: $P(B) = 0.68$,

$$\text{则 } P(A_2|B) = \frac{P(A_2B)}{P(B)} = \frac{0.3 \times 0.8}{0.68} = \frac{6}{17},$$

所以球员甲担当前卫的概率为 $\frac{6}{17}$.

-----10 分

18.(本小题满分 12 分)

【解】(1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = e^x + x - e$,

$$f'(x) = e^x + 1,$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 $f'(0) = 2$,

又 $f(0) = 1 - e$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$, 即 $y - (1 - e) = 2(x - 0)$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 2x + 1 - e$. -----6 分

(2) 若 $f(x)$ 只有一个极值点, 则 $f'(x) = 0$ 只有一个根,

所以方程 $e^x + a = 0$ 只有一个根, 即 $e^x = -a$ 只有一个解,

即 $y = -a$ 与 $y = e^x$ 只有一个交点,

因为 $y = e^x > 0$,

所以 $-a > 0$,

所以 $a < 0$,

所以 $x = \ln(-a)$, 当 $x < \ln(-a)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > \ln(-a)$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 只有一个极小值点 $x = \ln(-a)$,

故 a 的取值范围为 $(-\infty, 0)$. -----12 分

19. (本小题满分 12 分)

【解】(1) 证明: 连接 AC 交 BD 于点 O , 连接 FO ,

由 $ABCD$ 是正方形可得, O 是 AC 的中点, 又由 F 为 AE 的中点,

在 $\triangle ACE$ 中, FO 为中位线, 所以 $FO \parallel CE$,

因为 $CE \not\subset$ 平面 DFB , 且 $FO \subset$ 平面 DFB , 所以 $CE \parallel$ 平面 DFB . -----6 分

(2) 解: 连接 GO , 由 $BD \perp$ 面 AGC , 因为 $GO \subset$ 面 AGC , 所以 $BD \perp GO$,

又由 $ED \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $BD \subset$ 面 $ABCD$, 所以 $BD \perp ED$, 所以 $DE \parallel GO$,

所以点 G 为 BE 的中点, 以点 D 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系 $D-xyz$,

设 $DE = DA = DC = 2$,

则 $C(0, 2, 0)$, $D(0, 0, 0)$, $G(1, 1, 1)$, 所以 $\overrightarrow{DG} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{DC} = (0, 2, 0)$,

设平面 GDC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{DG} = x + y + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{DC} = 2y = 0 \end{cases}$,


令 $x = -1$, 则 $y = 0$, $z = 1$, 所以平面 GDC 的一个法向量为 $\vec{n} = (-1, 0, 1)$,

又平面 BDC 的一个法向量为 $\vec{m} = (0, 0, 1)$,

$$\text{所以 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{1 \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以二面角 $G-DC-B$ 的度数为 45° .

-----12 分



20. (本小题满分 12 分)

【解】(1) $y = a \cdot b^x$ 两边同时取自然对数得 $\ln y = \ln(a \cdot b^x) = \ln a + x \ln b$.

设 $\ln y = v$, 所以 $v = \ln a + x \ln b$,

因为 $\bar{x} = 3, \bar{v} = 0.84, \sum_{i=1}^5 x_i^2 = 55$,

$$\text{所以 } \ln b = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i v_i - 5 \bar{x} \bar{v}}{\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5 \bar{x}^2} = \frac{15.99 - 5 \times 3 \times 0.84}{55 - 5 \times 3^2} = 0.339.$$

把 $(3, 0.84)$ 代入 $\bar{v} = \ln a + \bar{x} \ln b$, 得 $\ln a = -0.177$, 所以

$$\hat{v} = -0.177 + 0.339x, \ln \hat{y} = -0.177 + 0.339x, \text{所以 } \hat{y} = e^{-0.177+0.339x},$$

即 y 关于 x 的回归方程为 $\hat{y} = e^{-0.177+0.339x}$.

-----6 分

(2) 2018 年-2022 年中国 MCN 市场规模的 5 个数据中, 与 $\bar{y}$ 的差的绝对值小于 1 的数据有 1.68, 2.45, 3.35, 共 3 个, 所以 X 的取值依次为 1, 2, 3

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 \cdot C_2^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}, P(X=2) = \frac{C_3^2 \cdot C_2^1}{C_5^3} = \frac{3}{5}, P(X=3) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}$$

所以 X 的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$

$$E(X) = 1 \times \frac{3}{10} + 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{9}{5}.$$

-----12 分

21. (本小题满分 12 分)

【解】(1) (法一) 证明: $\because$ 平面 $PAM \perp$ 平面 $ABCM$, $CM \perp CB$,

故以 C 为原点, CM 、 CB 为 x 、 y 轴, 作 $Cz \parallel$ 平面 PAM , 建立如图所示的空间直角坐标系,

则 $B(0, 2, 0)$, $A(2\sqrt{2}, 2, 0)$, $M(\sqrt{2}, 0, 0)$,

在图 1 中, 作 $DO \perp AM$ 于点 O , 过点 O 作 $OE \perp CD$ 于 E , $FO \perp BC$ 于点 F ,

$$\text{由题知, } AD=2, DM=\sqrt{2}, \therefore AM=\sqrt{6}, OD=\frac{AD \cdot DM}{AM}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \cos \angle ODM = \frac{OD}{DM} = \frac{DE}{OD}, \therefore DE = \frac{\frac{4}{3}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}, OF = CD - DE = \frac{4\sqrt{2}}{3},$$

$$OE = \sqrt{OD^2 - DE^2} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore P\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right),$$

$$\therefore \overrightarrow{BP} = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right), \overrightarrow{AM} = (-\sqrt{2}, -2, 0),$$

$$\therefore \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{AM} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \times (-\sqrt{2}) + \left(-\frac{4}{3}\right) \times (-2) + 0 = 0,$$

故 $PB \perp AM$.

(1) (法二) 证明: 过 $PO \perp AM$, 连接 OB ,

$$\text{由法一可得: } PO = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 由勾股定理可得 } OM = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\cos \angle AMB = \frac{AM^2 + BM^2 - AB^2}{2AM \cdot BM} = \frac{6 + 6 - 8}{2 \times 6} = \frac{1}{3},$$

在 $\triangle MBO$ 中, 由余弦定理可得 $OB^2 = OM^2 + MB^2 - 2OM \cdot BM \cos \angle AMB = \frac{4\sqrt{3}}{3}$,

$$\therefore OB^2 + OM^2 = \frac{48}{9} + \frac{6}{9} = MB^2, \therefore OB \perp AM,$$

$$\therefore OB \cap OP = O,$$

$$\therefore AM \perp \text{平面 } OPB, \therefore PB \subset \text{平面 } OPB,$$

$$\therefore PB \perp AM;$$

-----6 分




图1




图2

(2) 解: 设 $\overrightarrow{PN} = \lambda \overrightarrow{PB}, \lambda \in [0, 1]$, 则点 $N \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}(1-\lambda), \frac{2}{3}(1+2\lambda), \frac{2\sqrt{3}}{3}(1-\lambda) \right)$,

$$\therefore \overrightarrow{AN} = \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}(1+2\lambda), \frac{4}{3}(\lambda-1), \frac{2\sqrt{3}}{3}(1-\lambda) \right),$$

设平面 AMN 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AN} = 0 \end{cases}$, 即

$$\begin{cases} -\sqrt{2}x - 2y = 0 \\ -\frac{2\sqrt{2}}{3}(1+2\lambda)x + \frac{4}{3}(\lambda-1)y + \frac{2\sqrt{3}}{3}(1-\lambda)z = 0 \end{cases},$$

令 $y = -1$, 则 $x = \sqrt{2}$, $z = \frac{2\sqrt{3}\lambda}{1-\lambda}$, $\therefore \vec{m} = \left(\sqrt{2}, -1, \frac{2\sqrt{3}\lambda}{1-\lambda} \right)$,

同理可得, 平面 PAB 的法向量 $\vec{n} = (0, \sqrt{3}, 2)$,

$$\therefore \text{平面 } AMN \perp \text{平面 } PAB,$$

$$\therefore \vec{m} \cdot \vec{n} = -\sqrt{3} + 2 \times \frac{2\sqrt{3}\lambda}{1-\lambda} = 0, \text{ 解得 } \lambda = \frac{1}{5},$$



$$\therefore \text{平面 } AMN \text{ 的法向量 } \vec{m} = \left(\sqrt{2}, -1, \frac{2\sqrt{3}\lambda}{1-\lambda} \right) = \left(\sqrt{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2} \right),$$

$$\overrightarrow{AB} = (-2\sqrt{2}, 0, 0),$$

设直线 AB 与平面 AMN 所成角为 θ ,

$$\therefore \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AB}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \overrightarrow{AB}|}{|\vec{m}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{|-4|}{2\sqrt{2} \times \sqrt{2+1+\frac{3}{4}}} = \frac{2\sqrt{30}}{15}$$

故直线 AB 与平面 AMN 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{30}}{15}$. -----12 分



22. (本小题满分 12 分)

【解】(1) 由 $f(x) = x - a \ln x$ 得 $f'(x) = \frac{x-a}{x}$,

当 $a < 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 x 无限趋近于 0 时, $f(x) < 0$, 又 $f(1) = 1 > 0$, 故 $f(x)$ 只有 1 个零点;

当 $0 < a < e$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > a$, 令 $f'(x) < 0$, 解得 $0 < x < a$,

故 $f(x)$ 在区间 $(0, a)$ 上单调递减, 在区间 $(a, +\infty)$ 上单调递增;

所以当 $x = a$ 时, $f(x)$ 取得最小值 $f(a) = a - a \ln a = a(1 - \ln a)$,

当 $0 < a < e$ 时, $f(a) > 0$, 所以函数 $f(x)$ 无零点,

当 $a = 0$ 时, $f(x) = x > 0$ 恒成立, 所以函数 $f(x)$ 无零点,

综上所述, 当 $0 \leq a < e$ 时, $f(x)$ 无零点, 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 只有一个零点; -----6 分

(2) 由已知有 $x - a \ln x \geq ax^a \ln x - xe^x$, 所以 $x + xe^x \geq a \ln x + a \ln x \cdot x^a$,

所以 $x + xe^x \geq a \ln x + (a \ln x) \cdot e^{a \ln x}$,

构造函数 $g(x) = x + xe^x$, 则原不等式转化为 $g(x) \geq g(a \ln x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立,

$g'(x) = 1 + e^x(x+1)$, 记 $\varphi(x) = 1 + e^x(x+1)$, 所以 $\varphi'(x) = e^x(x+2)$,

令 $\varphi'(x) > 0$ ，解得 $x > -2$ ，令 $\varphi'(x) < 0$ ，解得 $x < -2$ ，

故 $\varphi(x)$ 在区间 $(-\infty, -2)$ 上单调递减，在区间 $(-2, +\infty)$ 上单调递增，

所以 $\varphi(x) \geq \varphi(-2) = 1 - \frac{1}{e^2} > 0$ ，所以 $g'(x) > 0$ ，即 $g(x)$ 单调递增，

所以 $x \geq a \ln x$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立，

即 $a \leq \frac{x}{\ln x}$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立，

令 $h(x) = \frac{x}{\ln x}$ ， $(x > 1)$ ，则 $h'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$ ，

令 $h'(x) > 0$ ，解得 $x > e$ ，令 $h'(x) < 0$ ，解得 $1 < x < e$ ，

故 $h(x)$ 在 $(1, e)$ 单调递减， $(e, +\infty)$ 单调递增，

故 $h(x)$ 的最小值为 $h(e) = \frac{e}{\ln e} = e$ ，

故 a 的取值范围是 $(-\infty, e]$ 。

-----12 分