


第 I 卷(选择题 共 60 分)

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)

1. 若 $(1-i)z = 2 + iz$, 则 z 在复平面内对应的点位于()
 A. 第一象限 B. 第二象限
 C. 第三象限 D. 第四象限
2. 若 \emptyset 是集合 $M = \{x \mid x^2 - ax + 1 = 0, a \in \mathbb{R}\}$ 的真子集, 则 a 的取值范围是()
 A. $(-2, 2)$ B. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$
 C. $[-2, 2]$ D. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$
3. 为了解“双减”政策实施后学生每天的体育活动时间,研究人员随机调查了该地区 10000 名学生每天进行体育运动的时间,将所得数据统计如下图所示,则可以估计该地区学生每天体育活动时间的平均数约为()

 频率/组距
 时间/分钟

时间/分钟	频率/组距
30~35	0.01
35~40	0.02
40~45	0.02
45~50	0.03
50~55	0.03
55~60	0.02
60~65	0.015
65~70	0.015
70~75	0.015
75~80	0.01
80~85	0.01
85~90	0.01

 A. 55 分钟 B. 56.5 分钟 C. 57.5 分钟 D. 58.5 分钟
4. 已知 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $\cos 2\alpha - 5\cos \alpha = 2$, 则 $\tan \alpha =$ ()
 A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$
5. 已知 $m, n \in \mathbb{R}$, 则 “ $\log_{\frac{1}{2}} m < \log_{\frac{1}{2}} n$ ” 是 “ $m^3 + 3m > n^3 + 3n$ ” 的()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

中 灵璧中学 宿城一中 合肥六中 太和中学 合肥七中

①) 两部分。满分150分, 考试时间120分钟。请在答题卡上作答。

10.

6. 将函数 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度, 再将所得图象上所

给 有点的横坐标缩小到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 得到函数

11.

$y = \sin\left(6x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 则 $f(x)$ 的解析式为 ()

12. 取

- A. $f(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{12}\right)$ B. $f(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$
 C. $f(x) = \cos\left(12x + \frac{\pi}{6}\right)$ D. $f(x) = \sin\left(12x + \frac{\pi}{12}\right)$

 成员
所
加时

 本题二
1.

7. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 1 \geq 0 \\ 3x - y - 3 \leq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = \frac{2y+1}{2x-1}$ 的取

值范围为 ()

- A. $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ B. $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$
 C. $[-1, 3]$ D. $[-3, 1]$

中

8. 攒尖是我国古代建筑中屋顶的一种结构形式, 通常有圆形攒尖、三角攒尖、四角攒尖, 多见于亭阁式建筑、园林建筑. 下面以四角攒尖为例, 如图 1, 它的屋顶部分的轮廓可以近似看作如图 2 所示的正四棱锥 $P-ABCD$, 其中底面边长和攒尖高的比值为 $\frac{1}{2}$,

1.

若点 E 是棱 PD 的中点, 则异面直线 PB 与 CE 所成角的正切值为 ()

1




图1

3n"




图2

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 $F(-c, 0)$ ，直

线 $l: 3x + \sqrt{3}y + 3c = 0$ 与双曲线左支的一个交点为 P ，若 $|PF| = 2c$ ，则双曲线的离心率为（ ）

- A. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ C. $\sqrt{3}+1$ D. $\sqrt{5}+1$

10. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $(a+b)(\sin A - \sin B) = c(\sin C + \sin B)$ ，若角 A 的内角平分线 AD 的长为 2，则 $4b+c$ 的最小值为（ ）

- A. 10 B. 12 C. 16 D. 18

11. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，平面 $SAC \perp$ 平面 ABC ，且 $AB \perp AC$ ， $\angle SCA = 30^\circ$ ，若 $AB = SA = 4$ ，则三棱锥 $S-ABC$ 的外接球的表面积为（ ）

- A. 40π B. 64π C. 80π D. 128π

12. 已知不等式 $ax - \frac{\ln x}{x^2} \geq \frac{a}{x}$ 对 $\forall x \in [1, +\infty)$ 恒成立，则实数 a 的最小值为（ ）

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

第 II 卷 (非选择题 共 90 分)

本卷包括必考题和选考题两部分。第 13 题~第 21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22 题~第 23 题为选考题，考生根据要求作答。

二、填空题 (本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

13. 已知平面向量 $\mathbf{m} = (1, \lambda)$, $\mathbf{n} = (2, 3)$ ，若 $(\mathbf{m} + \mathbf{n}) \parallel (\mathbf{m} - \mathbf{n})$ ，则实数 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 某市卫健委从 4 名工作人员和 5 名专家中选取 3 人，组成督察小组到市直学校检查防疫工作，若工作人员和专家都需至少选一人，则不同的选法种数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (用数字作答)。

15. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，点 $P(4, 0)$ 在点 F 的右边，若 C 上的点 Q 满足 $|QF| = |QP|$, $\angle QPF = 60^\circ$ ，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 已知函数 $f(x) = \frac{8}{e^x + 4}$ ，则下列说法中：

① 函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(\ln 4, 1)$ 中心对称；

② 函数 $f(x)$ 的值域为 $(0, 2)$ ；

$\infty, 0)$, 直
若

$\bar{s}+1$

角平分线
 $B \perp AC$,
的外接球

18π
数 a 的最

题, 每个试
要求作答.

$m-n)$,

成督察小
至少选一

$(4, 0)$ 在点
 60° , 则

③函数 $g(x) = f(x) - x^2 - 1$ 的所有零点之和大于 0.

其中所有正确说法的序号为_____.

三、解答题 (本大题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明, 证明
过程或演算步骤.)

17. (本小题满分 12 分)

设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_3 = 30$, $S_5 - S_4 = 16$.

(I) 求 a_n ;

(II) 记 $b_n = \frac{1}{na_n}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: $T_n < \frac{11}{36}$.

18. (本小题满分 12 分)

新冠疫情期间, 口罩的消耗量日益增加, 某药店出于口罩进货量的
考虑, 连续 9 天统计了第 x_i ($i = 1, 2, 3, \dots, 9$) 天的口罩的销售量 y_i

(百件), 得到的数据如下: $\sum_{i=1}^9 x_i = 45$, $\sum_{i=1}^9 y_i = 171$,

$$\sum_{i=1}^9 x_i^2 = 285, \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 1095, \sum_{i=1}^9 (y_i - \bar{y})^2 = \frac{3125}{3}.$$

(I) 若用线性回归模型 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 拟合 y 与 x 之间的关系, 求该回
归直线的方程;

(II) 统计学家甲认为用(I)中的线性回归模型(下面简称模型 1)
进行拟合, 不够精确, 于是尝试使用非线性模型(下面简称模
型 2)得到 x_i 与 y_i 之间的关系, 且模型 2 的相关系数 $r_2 =$
0.989, 试通过计算说明模型 1, 2 中, 哪一个模型的拟合效
果更好.


$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$;

对于一组具有线性相关关系的数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, 3, \dots, n$), 其回归
直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}.$$

19. (本小题满分 12 分)
- 多面体 $ABCDE$ 如图所示, 其中 $\triangle BCD$ 为等腰直角三角形, 且 $\angle BDC = 90^\circ$, $EB = EC = AB = AC$.
- (I) 求证: $BC \perp DE$;
- (II) 若 $\frac{BD}{BA} = \frac{4\sqrt{2}}{5}$, F 为 $\triangle ABC$ 的重心, $EF \perp$ 平面 ABC , 求直线 CA 与平面 BEC 所成角的正弦值.



20. (本小题满分 12 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $A(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 且点 A 到 C 的右顶点的距离为 $\frac{\sqrt{39}}{2}$.

(Ⅰ) 求椭圆 C 的方程;

(Ⅱ) 设 O 为坐标原点, 直线 $l: y = kx + m (k > 0, m < 0)$ 与 C 交于 M, N 两点, 记线段 MN 的中点为 P , 连接 OP 并延长交 C 于点 Q , 直线 $x=6$ 交射线 OP 于点 R , 且

求证: 直线 l 过定点.

21. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = m \ln x - x e^x + x$.

(I) 若 $m=1$, 求 $f(x)$ 的最大值;

(II) 若 $f(x_1) + x_1 e^{x_1} + m = 0$, $f(x_2) + x_2 e^{x_2} + m = 0$, 其中 $x_1 \neq x_2$, 求实数 m 的取值范围.

$$\left(\frac{\pi}{2} + x \right) \ln x - x e^x + x = 0$$

$$\left(\frac{\pi}{2} + x \right) \ln x = x e^x - x$$

$$\left(\frac{\pi}{2} + x \right) \ln x - x = e^x - 1$$

$$\left(\frac{\pi}{2} + x \right) \ln x - x = e^x - 1$$

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。注意：只能做选定的题目，如果多做，则按所做的第一题记分，解答时请写清题号。

22. (本小题满分 10 分) 选修 4-4：坐标系与参数方程

在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \alpha \\ y = 1 + \sin \alpha \end{cases}$

(α 为参数)，以坐标原点 O 为极点， x 轴的非负半轴为极轴，建立极坐标系，得曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \cos^2 \theta + \cos \theta - \rho = 0$ 。

- (I) 求曲线 C_1 的极坐标方程与 C_2 的直角坐标方程；
(II) 已知射线 $l: y = kx (x \geq 0, 1 \leq k \leq 2)$ 与曲线 C_1 交于 O, M 两点，与 C_2 交于 O, N 两点，求 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的取值范围。

23. (本小题满分 10 分) 选修 4-5：不等式选讲

已知函数 $f(x) = |2x-3| + |3x-6| + 2a + 2$ 。

- (I) 当 $a = -1$ 时，求不等式 $f(x) < 2$ 的解集；
(II) 若关于 x 的不等式 $f(x) - |x-2| \leq a^2$ 有实数解，求实数 a 的取值范围。

I号卷·A10联盟2022年高考最后一卷

理科数学参考答案

一、选择题（本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）


题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	D	D	B	A	B	B	C	A	D	C	C

1. A 由 $(1-i)z=2+iz$, 得 $z=\frac{2}{1-2i}=\frac{2(1+2i)}{5}=\frac{2}{5}+\frac{4}{5}i$, 故复数 z 在复平面内对应的点为 $\left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$, 位于第一象限. 故选A.
2. D 由“ \emptyset 是集合 $M=\{x|x^2-ax+1=0, a\in \mathbb{R}\}$ 的真子集”得
 $M=\{x|x^2-ax+1=0, a\in \mathbb{R}\}\neq \emptyset$, 即方程 $x^2-ax+1=0$ 有实数解,
 $\therefore \Delta=a^2-4\geq 0$, 解得 $a\leq -2$ 或 $a\geq 2$. 故选D.
3. D 由题意得, $0.1+0.2+0.3+20a+0.1=1$, 解得 $a=0.015$, 故该地区学生每天体育活动时间的平均数约为 $35\times 0.1+45\times 0.2+55\times 0.3+65\times 0.15+75\times 0.15+85\times 0.1=58.5$. 故选D.
4. B 由 $\cos 2\alpha-5\cos \alpha=2$, 得 $2\cos^2 \alpha-5\cos \alpha-3=0$, 解得 $\cos \alpha=-\frac{1}{2}$ 或 $\cos \alpha=3$
(舍去), 又 $\because \alpha\in(0, \pi)$, $\therefore \alpha=\frac{2\pi}{3}$, $\therefore \tan \alpha=-\sqrt{3}$. 故选B.
5. A $\because \log_{\frac{1}{2}}m < \log_{\frac{1}{2}}n \Leftrightarrow m > n > 0$, $m^3+3m > n^3+3n \Leftrightarrow m > n$,
 $\therefore “\log_{\frac{1}{2}}m < \log_{\frac{1}{2}}n”$ 是 $“m^3+3m > n^3+3n”$ 的充分不必要条件. 故选A.
6. B 将 $y=\sin\left(6x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍, 纵坐标不变, 得到 $y=\sin\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 再将 $y=\sin\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度, 得到 $f(x)=\sin\left[3\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{6}\right]=\sin\left(3x-\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象. 故选B.

7. B 作出约束条件的可行域, 如图阴影部分所示, 其中 $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(2,3)$.

$$z=\frac{2y+1}{2x-1}=\frac{y+\frac{1}{2}}{x-\frac{1}{2}}$$

$$\text{表示定点}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)\text{与可行域内点}(x,y)$$




I号卷·A10联盟2022年高考最后一卷·理科数学参考答案 第1页 共8页

连线的斜率，则 z 的取值范围是 $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ 。故选B.

8. C 如图，连接 BD ，设 O 为 BD 的中点， $\therefore OE \parallel BP$ ， \therefore 异面直线 BP 与 CE 所成角为 $\angle OEC$ 或其补角。连接 OC, OP ，易得 $OP \perp OC, BD \perp OC$ ， $\therefore OC \perp$ 平面 PBD ， $\therefore OC \perp OE$ 。设 $AB = a, OP = h$ ，则由题意得 $\frac{a}{h} = \frac{1}{2}$ ， $OB = OC = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，

$$OE = \frac{1}{2}BP = \frac{1}{2}\sqrt{OB^2 + OP^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}a^2 + h^2}，\therefore \text{在Rt}\triangle OEC \text{中，}$$

$$\tan \angle OEC = \frac{OC}{OE} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}a^2 + h^2}} = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + 4a^2}} = \frac{2}{3}。故选C。$$



9. A 设双曲线的右焦点为 F_1 ，由题意得，直线 l 的倾斜角为 $-\sqrt{3}$ ，且经过双曲线的左焦点，当点 P 位于第三象限时， $\angle F_1FP = 60^\circ$ ，又 $|PF| = |F_1F| = 2c$ ，连接 PF_1 ，此时 $\triangle PF_1F$ 为正三角形，不符合题意，则点 P 位于第二象限，故 $\angle F_1FP = 120^\circ$ ，连接 PF_1 ， $\because |PF| = 2c$ ，由双曲线的定义知 $|PF_1| = 2a + 2c$ ， $\because |F_1F| = 2c$ ， $\therefore \triangle PF_1F$ 为等腰三角形， $\therefore |PF_1| = 2|PF|\sin \frac{\angle PFF_1}{2} = 4c \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}c$ ，

$$\therefore 2a + 2c = 2\sqrt{3}c，\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}。故选A。$$

10. D 由正弦定理得 $(a+b)(a-b) = c(c+b)$ ，即 $a^2 = b^2 + c^2 + bc$ ， \therefore 由余弦定理易得 $\cos A = -\frac{1}{2}$ ，又 $0 < A < \pi$ ， $\therefore A = \frac{2\pi}{3}$ 。 $\because AD$ 平分角 A ， $\therefore \angle BAD = \angle CAD = 60^\circ$ 。由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ ，得 $\frac{1}{2}bc \sin 120^\circ = \frac{1}{2}c \cdot AD \sin 60^\circ + \frac{1}{2}b \cdot AD \sin 60^\circ$ ，即 $bc = 2(b+c)$ ，即 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2}$ ， $\therefore 4b + c = 2\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)(4b + c) = 2\left(5 + \frac{c}{b} + \frac{4b}{c}\right) \geq 2(5 + 2 \times 2) = 18$ ，当且仅当 $c = 2b$ 时等号成立，即 $4b + c$ 的最小值为18。故选D。

11. C 由题意得， $BA \perp$ 平面 SAC ，将三棱锥补成三棱柱 $SAC-S_1BC_1$ ，则三棱柱 $SAC-S_1BC_1$ 的外接球即为所求。设外接球的球心为 O ，则 $\triangle SAC$ 的外心为 O_1 ，则 $OO_1 = \frac{1}{2}AB = 2$ ，又 $O_1A = \frac{1}{2} \cdot \frac{SA}{\sin \angle SCA} = 4$ ，所以外接球的半径 $R = \sqrt{OO_1^2 + O_1A^2} = 2\sqrt{5}$ ，所以其表面积 $S = 4\pi R^2 = 80\pi$ 。故选C。

12. C 不等式 $ax - \frac{\ln x}{x^2} \geq \frac{a}{x}$ 对 $\forall x \in [1, +\infty)$ 恒成立等价于不等式 $ax^3 - \ln x - ax \geq 0$ 对

$\forall x \in [1, +\infty)$ 恒成立, 设 $g(x) = ax^3 - \ln x - ax = ax(x^2 - 1) - \ln x (x \geq 1)$,
 $g(1) = 0$, 则 $g'(x) = 3ax^2 - \frac{1}{x} - a = \frac{3ax^3 - ax - 1}{x}$, 当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) < 0$, 则
 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore g(x) \leq g(1) = 0$ 与题意矛盾, $\therefore a > 0$. 令
 $h(x) = 3ax^3 - ax - 1 (x \geq 1)$, 则 $h'(x) = 9ax^2 - a = a(3x+1)(3x-1) > 0$, $\therefore h(x)$
 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore h(x) \geq h(1) = 2a-1$, 当 $2a-1 \geq 0$, 即 $a \geq \frac{1}{2}$ 时,
 $g'(x) \geq 0$, 则 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore g(x) \geq g(1) = 0$, 符合题意; 当
 $2a-1 < 0$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 由 $h(1) = 2a-1 < 0$, $h\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{3}{a^2} - 2 > 0$, 得存
 在 $x_0 \in \left(1, \frac{1}{a}\right)$, 使 $h(x_0) = 0$, 当 $x \in (1, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, 即 $g'(x) < 0$, 则 $g(x)$
 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, 则 $g(x) < g(1) = 0$, 不符合题意, 因此实数 a 的最小值为 $\frac{1}{2}$.
 故选 C.

二、填空题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 将答案填写在题中的横线上.)

13. $\frac{3}{2}$

由题意得, $\mathbf{m} \parallel \mathbf{n}$, $\therefore 2\lambda = 3$, 即 $\lambda = \frac{3}{2}$.

14. 70

从 4 名工作人员和 5 名专家中选取 3 人, 共有 C_9^3 种情况. 若全为工作人员, 共有 C_4^3 种;
 若全为专家, 共有 C_5^3 种, \therefore 工作人员、专家至少各一人, 则不同的选法共有
 $C_9^3 - C_4^3 - C_5^3 = 70$ (种).

15. $\frac{8}{5}$

由题意得, 点 P 在焦点 F 的右边, 准线为 $l: x = -\frac{p}{2}$, 作 $QM \perp l$ 于 M , 则

$|QF| = |QM|$. $\because |QF| = |QP|$, 又 $\angle QPF = 60^\circ$, $\therefore \triangle QPF$ 为正三角形, 易知


$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 又 $|QF| = |QP|$, \therefore 点 Q 的横坐标为 $2 + \frac{p}{4}$, $\therefore |QM| = 2 + \frac{p}{4} + \frac{p}{2} = 2 + \frac{3p}{4}$,

$|PF| = 4 - \frac{p}{2}$, $\therefore 2 + \frac{3p}{4} = 4 - \frac{p}{2}$, 解得 $p = \frac{8}{5}$.

16. ①②

因为 $f(2\ln 4-x) + f(x) = \frac{8}{e^{2\ln 4-x} + 4} + \frac{8}{e^x + 4} = 2$, 故 $f(x)$ 的图象关于点 $(\ln 4, 1)$
 中心对称, 故①正确; 易知函数 $f(x)$ 在 \mathbb{R} 上单调递减, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$,

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 2$, 故函数 $f(x)$ 的值域为 $(0, 2)$, 故②正确; 令 $g(x) = 0$, 得 $f(x) = x^2 + 1$, 在同一直角坐标系中分别作出函数 $f(x)$ 和 $y = x^2 + 1$ 的图象如下所示, 观察可知, $g(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , $x_1 + x_2 < 0$, 故③错误.



三、解答题 (本大题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.)

17. (本小题满分 12 分)

(I) 设数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d ,

$$\begin{aligned} \text{由 } \begin{cases} S_5 - S_4 = a_5 = 16 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 30 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} a_1 + 4d = 16 \\ a_1 + d = 10 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a_1 = 8 \\ d = 2 \end{cases}, \\ \therefore a_n = 2n + 6. \end{aligned}$$

$$(II) \text{ 证明: } \because b_n = \frac{1}{na_n} = \frac{1}{n(2n+6)} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right),$$

$$\begin{aligned} \therefore T_n &= b_1 + b_2 + \cdots + b_n \\ &= \frac{1}{6} \times \left[\left(1 - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right) \right] \\ &= \frac{1}{6} \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) < \frac{1}{6} \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{36}. \end{aligned}$$

18. (本小题满分 12 分)

$$(I) \text{ 由题意得, } \hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^9 x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^9 x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{1095 - 9 \times 5 \times 19}{285 - 9 \times 5^2} = 4, \dots \dots 4 \text{ 分}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 19 - 4 \times 5 = -1, \dots \dots 5 \text{ 分}$$

故所求回归直线的方程为 $\hat{y} = 4x - 1$; \dots \dots 6 \text{ 分}

(II) 模型 1 的相关系数

$$r_1 = \frac{\sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^9 (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{240}{\sqrt{60 \times \frac{3125}{3}}} = \frac{240}{250} = 0.96 < 0.989, \dots \dots 10 \text{ 分}$$

故模型 2 的拟合性更好. 12 分

19. (本小题满分 12 分)

(I) 取 BC 中点 O , 连接 AO, DO, EO , $\because BD = CD$, $\therefore DO \perp BC$ 1 分

同理可得, $EO \perp BC$ 2 分

$\therefore DO \cap EO = O$, $\therefore BC \perp$ 平面 DOE 3 分

又 $DE \subset$ 平面 DOE , $\therefore BC \perp DE$ 4 分

(II) 由 (I) 得, O 为 BC 中点, 且 $AO \perp BC$, 如图建立空间直角坐标系 $Oxyz$.

设 $AB = 5$, 则 $AC = 5$, $BD = CD = 4\sqrt{2}$, $BO = 4$, $AO = 3$,

$\therefore F$ 为 $\triangle ABC$ 的重心, $\therefore OF = \frac{1}{3}OA = 1$, $EF = 2\sqrt{2}$,

则 $A(0, 3, 0)$, $B(-4, 0, 0)$, $C(4, 0, 0)$, $E(0, 1, 2\sqrt{2})$, 则 $\overrightarrow{CA} = (-4, 3, 0)$ 5 分

设平面 BEC 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 且 $\overrightarrow{BC} = (8, 0, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (4, 1, 2\sqrt{2})$,

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{BC} \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \overrightarrow{BE} \cdot \mathbf{n} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 8x = 0 \\ 4x + y + 2\sqrt{2}z = 0 \end{cases},$$


令 $y = 2\sqrt{2}$, 则 $x = 0$, $z = -1$,

$$\therefore \mathbf{n} = (0, 2\sqrt{2}, -1)$$
. 9 分

设直线 CA 与平面 BEC 所成角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{CA}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{CA} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{6\sqrt{2}}{5 \times 3} = \frac{2\sqrt{2}}{5},$$

即直线 CA 与平面 BEC 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ 12 分



20. (本小题满分 12 分)

(I) 由题意得, $(-1-a)^2 + \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{39}{4}$, 解得 $a=2$ (负值舍去), 2 分

将 $A\left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 代入 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 可得, $\frac{1}{4} + \frac{3}{4b^2} = 1$, 解得 $b^2 = 1$, 4 分

则椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 5 分

(II) 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, $l: y = kx + m (k > 0, m < 0)$,

联立 $\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 4 \\ y = kx + m \end{cases}$, 得 $(1+4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$, 由 $\Delta > 0$, 得 $1+4k^2 > m^2$.

$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{8km}{1+4k^2}, \therefore P\left(-\frac{4km}{1+4k^2}, \frac{m}{1+4k^2}\right).$$

由斜率公式可知 $k_{OP} = -\frac{1}{4k}$, $\therefore l_{OP}: y = -\frac{1}{4k}x$, $\therefore R\left(6, -\frac{3}{2k}\right)$ 8分

联立 $\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 4 \\ y = -\frac{1}{4k}x \end{cases}$, 得 $x^2 = \frac{16k^2}{1+4k^2}$, 即 $x_Q^2 = \frac{16k^2}{1+4k^2}$ 9分

$$\therefore |OQ|^2 = |OP| \cdot |OR|, \therefore x_Q^2 = x_P \cdot x_R, \therefore \frac{16k^2}{1+4k^2} = \frac{24km}{1+4k^2}, \therefore m = -\frac{2}{3}k,$$

此时满足 $\Delta > 0$, \therefore 直线 l 过定点 $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ 12分

21. (本小题满分 12 分)

(I) 当 $m=1$ 时, $f(x) = \ln x - xe^x + x$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x} + 1 - (x+1)e^x = (x+1)\left(\frac{1}{x} - e^x\right)$.

令 $\varphi(x) = \frac{1}{x} - e^x (x > 0)$, 则 $\varphi'(x) = -\frac{1}{x^2} - e^x < 0$,

$\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 2分

又 $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \sqrt{e} > 0$, $\varphi(1) = 1 - e < 0$,

\therefore 存在 $x_0 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $\varphi(x) = \frac{1}{x_0} - e^{x_0} = 0$, 3分

\therefore 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

$\therefore f(x)$ 有最大值 $f(x_0) = \ln x_0 + x_0 - x_0 e^{x_0} = \ln(x_0 e^{x_0}) - x_0 e^{x_0} = \ln 1 - 1 = -1$ 5分

另法: 当 $m=1$ 时, $f(x) = \ln x - xe^x + x = \ln(xe^x) - xe^x$, 令 $t = xe^x > 0$,

则 $h(t) = \ln t - t$, 其中 $t > 0$, $h'(t) = \frac{1-t}{t}$,

\therefore 当 $t \in (0, 1)$ 时, $h'(t) > 0$, $h(t)$ 单调递增; 当 $t \in (1, +\infty)$ 时, $h'(t) < 0$, $h(t)$ 单调递减, 故 $h(t)_{\max} = h(1) = -1$, 即 $f(x)$ 的最大值为 -1 5分

(II) 令 $g(x) = m \ln x + x + m$, $x \in (0, +\infty)$,

由题意知 m 的取值应满足函数 $g(x)$ 有两个零点.

易得 $g'(x) = \frac{m}{x} + 1 = \frac{x+m}{x}$,

若 $m \geq 0$, 则 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x)$ 至多有一个零点, 不符合题意, 舍去; 6分

若 $m < 0$, 则当 $x \in (0, -m)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减;

当 $x \in (-m, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

要使函数 $g(x)$ 有两个零点，则 $g(x)_{\min} = g(-m) = m \ln(-m) < 0$ ， $\therefore m < -1$ 。……8分

易知 $g\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} > 0$ ， $g(e^{-2m}) = m \ln e^{-2m} + e^{-2m} + m = -2m^2 + e^{-2m} + m (m < -1)$ 。

令 $p(x) = e^{-2x} - 2x^2 + x, x < -1$ ，则 $p'(x) = -2e^{-2x} - 4x + 1, x < -1$ ，

令 $q(x) = -2e^{-2x} - 4x + 1, x < -1$ ，则 $q'(x) = 4e^{-2x} - 4 > 0, x < -1$ ，

$\therefore p'(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递增， $\therefore p'(x) < p'(-1) = -2e^2 + 5 < 0$ ，

$\therefore p(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减，

$\therefore p(x) > p(-1) = e^2 - 2 - 1 > 0$ ， $\therefore g(e^{-2m}) > 0$ ，……………11分

由 $\frac{1}{e} < -m < e^{-2m}$ 知 $g(x)$ 在 $(0, -m)$ 和 $(-m, +\infty)$ 上各有一个零点，

则实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -1)$ 。……………12分

另法：令 $g(x) = m \ln x + x + m, x \in (0, +\infty)$ ，

由题意知 m 的取值应满足函数 $g(x)$ 有两个零点。

若 $m \geq 0$ ，易知 $g(x)$ 单调递增，不符合题意，舍去；……………6分

若 $m < 0$ ，由 $g(x) = m \ln x + x + m = 0, x \in (0, +\infty)$ 知， $-\frac{1 + \ln x}{x} = \frac{1}{m}$ ，

令 $h(x) = -\frac{1 + \ln x}{x}, x \in (0, +\infty)$ ，则 $h'(x) = \frac{\ln x}{x^2}, x \in (0, +\infty)$ ，

$\therefore h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。

又 $h(1) = -1$ ，且 $x \in (1, +\infty)$ 时， $h(x) < 0$ ， $\therefore \frac{1}{m} > -1$ ，解得 $m < -1$ ，

故实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -1)$ 。……………12分

请考生从第 22、23 题中任选一题作答。注意：只能做选定的题目，如果多做，则按所做的第一题记分，解答时请写清题号。

22. (本小题满分 10 分) 选修 4-4：坐标系与参数方程

(I) 由 $\begin{cases} x = \cos \alpha \\ y = 1 + \sin \alpha \end{cases}$ 得， $x^2 + (y-1)^2 = 1$ ，即 $x^2 + y^2 = 2y$ ，

将 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 代入，得 $\rho^2 = 2\rho \sin \theta$ ，

故曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho = 2 \sin \theta$ 。……………3分

由 $\rho \cos^2 \theta + \cos \theta - \rho = 0$ 得， $\rho^2 \sin^2 \theta = \rho \cos \theta$ ，

将 $\rho \cos \theta = x, \rho \sin \theta = y$ 代入，得 $y^2 = x$ ，

即曲线 C_2 的直角坐标方程为 $y^2 = x$ 。……………5分

(II) 由题意得，射线 $l: y = kx (x \geq 0, 1 \leq k \leq 2)$ 的极坐标方程为

$\theta = \theta_0 (\tan \theta_0 = k, \rho \geq 0)$ 。……………6分

联立 $\begin{cases} \rho = 2 \sin \theta \\ \theta = \theta_0 \end{cases}$, 得 $|\overrightarrow{OM}| = \rho_M = 2 \sin \theta_0$, 7 分

联立 $\begin{cases} \rho \sin^2 \theta = \cos \theta \\ \theta = \theta_0 \end{cases}$, 得 $|\overrightarrow{ON}| = \rho_N = \frac{\cos \theta_0}{\sin^2 \theta_0}$, 8 分

$$\therefore \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = |\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}| = 2 \sin \theta_0 \cdot \frac{\cos \theta_0}{\sin^2 \theta_0} = \frac{2}{\tan \theta_0} = \frac{2}{k} \in [1, 2]. \quad \text{10 分}$$

23. (本小题满分 10 分) 选修 4-5: 不等式选讲

(I) 由题意得, $|2x-3| + |3x-6| < 2$,

当 $x < \frac{3}{2}$ 时, 不等式化为 $3 - 2x + 6 - 3x < 2$, 解得 $x > \frac{7}{5}$, $\therefore \frac{7}{5} < x < \frac{3}{2}$;

当 $\frac{3}{2} \leq x \leq 2$ 时, 不等式化为 $2x - 3 + 6 - 3x < 2$, 解得 $x > 1$, $\therefore \frac{3}{2} \leq x \leq 2$;

当 $x > 2$ 时, 不等式化为 $2x - 3 + 3x - 6 < 2$, 解得 $x < \frac{11}{5}$, $\therefore 2 < x < \frac{11}{5}$,

则不等式 $f(x) < 2$ 的解集为 $\left\{ x \mid \frac{7}{5} < x < \frac{11}{5} \right\}$ 5 分

(II) 由题意得, $a^2 - 2a - 2 \geq |2x-3| + |2x-4|$ 有实数解, 7 分

$\because |2x-3| + |2x-4| \geq |(2x-3)-(2x-4)| = 1$, 8 分

当且仅当 $(2x-3)(2x-4) \leq 0$ 时取等号,

$\therefore a^2 - 2a - 2 \geq 1$, 解得 $a \leq -1$ 或 $a \geq 3$,

$\therefore a$ 的取值范围是 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 10 分

以上各解答题如有不同解法并且正确, 请按相应步骤给分.

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（**网址：www.zizzs.com**）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线