

西南大学附中 2022—2023 学年度下期期末考试

高一数学答案

一、单项选择题：每小题 5 分，共 40 分.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	A	D	C	A	B	C	C

二、多项选择题：每小题 5 分，共 20 分.

题号	9	10	11	12
答案	AB	BCD	ACD	ACD

三、填空题：每小题 5 分，共 20 分.

题号	13	14	15	16
答案	3	$\sqrt{10}$	100π	$\sqrt{3}$

四、解答题：


17. 解：(1) 连接 A_1B 交 AB_1 于点 F ，连接 EF ，

则在正方形 ABB_1A_1 中， F 为 A_1B 的中点，

又 E 为 A_1C_1 的中点，所以 EF 为 $\triangle A_1BC_1$ 的中位线，则 $EF \parallel BC_1$ ；

又 $EF \subset$ 平面 AB_1E ， $BC_1 \not\subset$ 平面 AB_1E ，

所以 $BC_1 \parallel$ 平面 AB_1E .



(2) 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，则 $AC \parallel A_1C_1$ ，则 $\angle A_1C_1B$ (或其补角) 为异面直线 BC_1 与 AC 所成的角.

在 $\triangle A_1BC_1$ 中， $A_1C_1=1$ ， $A_1B=\sqrt{2}$ ， $BC_1=\sqrt{2}$ ，则 $\cos \angle A_1C_1B = \frac{A_1C_1^2 + BC_1^2 - A_1B^2}{2A_1C_1 \cdot BC_1} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

所以异面直线 BC_1 和 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

18. 解：(1) 因为 $c \cos A + a \cos C = \frac{b}{2 \cos B}$ ，

由正弦定理得： $\sin C \cos A + \sin A \cos C = \frac{\sin B}{2 \cos B}$ ，

即 $\sin(A+C) = \frac{\sin B}{2 \cos B}$ ， $\sin B = \frac{\sin B}{2 \cos B}$ ，

因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin B \neq 0$ ，所以 $\cos B = \frac{1}{2}$ ，所以 $B = \frac{\pi}{3}$ ；

(2) 因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$ ，所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \sqrt{3}$ ，解得 $ac = 4$ ，

由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ ，则 $b^2 = (a+c)^2 - 3ac = 24$ ，

所以 $b = 2\sqrt{6}$.

19. 解：(1) 取 AB 的中点 E ，连接 DB ， DE ，

$Rt\triangle DCB$ 中， $DB = \sqrt{2}$ ，梯形 $ABCD$ 中， $DC \parallel BE$ ， $DC = BE$ ，所以四边形 $BCDE$ 为正方形，

所以 $DE = BE = 1$ ，则 $AE = AB - BE = 1$ ，


所以 $Rt\triangle ADE$ 中， $AD = \sqrt{DE^2 + AE^2} = \sqrt{2}$ ，

又 $AB = 2$ ，所以 $AB^2 = BD^2 + AD^2$ ，则 $AD \perp BD$ ，

又 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $AD \perp PD$ ，

由于 $PD \cap BD = D$ ，所以 $AD \perp$ 平面 PBD ，

又 $PB \subset$ 平面 PBD ，所以 $AD \perp PB$.



(2) 以 C 为坐标原点， $\overrightarrow{CD}$ ， $\overrightarrow{CB}$ 为 x 轴， y 轴正方向，在平面 PCD 内过点 C 作 CD 的垂线为 z 轴，

建立如图所示的空间直角坐标系，


则 $C(0,0,0)$ ， $P(1,0,2)$ ， $A(2,1,0)$ ， $B(0,1,0)$ ， $\overrightarrow{PA} = (1,1,-2)$ ， $\overrightarrow{AB} = (-2,0,0)$ ， $\overrightarrow{CP} = (1,0,2)$ ，

设平面 PAB 的法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$ ，则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PA} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} x+y-2z=0 \\ -2x=0 \end{cases}$ ，

令 $y=2$ ，则 $\vec{n} = (0,2,1)$ ，

设直线 PC 与平面 PAB 所成角为 θ ，

则 $\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{PC}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{PC} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{PC}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{2}{5}$.



20. 解：(1) 在 $\triangle ABC$ 中由余弦定理得： $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B$ ，

即 $BC^2 + 3BC - 4 = 0$ ，解得 $BC = -4$ (舍) 或 $BC = 1$ ，

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 \times \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

(2) 因为 $\angle BAC = \theta$ ， $\angle CAD = \frac{\pi}{6}$ ， $\angle BCD = \frac{2\pi}{3}$ ，

所以 $\angle ACB = \frac{1}{3}\pi - \theta$, $\angle ACD = \frac{1}{3}\pi + \theta$, $\angle ADC = \frac{1}{2}\pi - \theta$,

在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得: $\frac{BC}{\sin \theta} = \frac{AC}{\sin \frac{2\pi}{3}}$, 所以 $\frac{BC}{AC} = \frac{2 \sin \theta}{\sqrt{3}}$.

在 $\triangle ACD$ 中, 由正弦定理得: $\frac{\sqrt{3}BC}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{AC}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}$, $\frac{BC}{AC} = \frac{1}{2\sqrt{3} \cos \theta}$,

所以 $4 \sin \theta \cos \theta = 1$, 即 $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$,

因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{3}$, 所以 $0 < 2\theta < \frac{2\pi}{3}$, 所以 $2\theta = \frac{\pi}{6}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{12}$.

21. 解: (1) 由题意得 $AE \perp CE$, $AE \perp BE$,

又 $BE \cap CE = E$, $CE \subset$ 平面 BCE , $BE \subset$ 平面 BCE ,

所以 $AE \perp$ 平面 BCE , 又 $AE \subset$ 平面 AEB ,

所以平面 $AEB \perp$ 平面 BCE ,

(2) 由 $AE \perp CE$, $AE \perp BE$, 则 $\angle CEB$ 为二面角 $B-AE-C$ 的平面角, 所以 $\angle CEB = 30^\circ$,

又 $BE = 2$, $CE = \sqrt{3}$, 所以 $BC = 1$.

以 E 为坐标原点, $\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB}$ 分别为 x, y 轴正方向, 在平面 BCE 内过点 E 作 BE 的垂线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系,

则 $E(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $D(1, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{EB} = (0, 2, 0)$,

则 $\overrightarrow{EF} = \lambda \overrightarrow{EB} = (0, 2\lambda, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (-1, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{AE} = (-2, 0, 0)$,


$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} = (-2, 0, 0) + (0, 2\lambda, 0) = (-2, 2\lambda, 0)$.

设平面 ADE 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \end{cases}$,

$$\text{即 } \begin{cases} -x + \frac{3y}{2} + \frac{\sqrt{3}z}{2} = 0 \\ -2x = 0 \end{cases}$$

令 $y = 1$, 则 $\vec{m} = (0, 1, -\sqrt{3})$,

设平面 ADF 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,



$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AF} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -x + \frac{3y}{2} + \frac{\sqrt{3}z}{2} = 0 \\ -2x + 2\lambda y = 0 \end{cases}$$

令 $y = 1$, 则 $\vec{n} = (\lambda, 1, -\sqrt{3} + \frac{2\sqrt{3}\lambda}{3})$,

$$\text{则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{4 - 2\lambda}{2 \times \sqrt{\frac{7}{3}\lambda^2 - 4\lambda + 4}},$$

又由二面角 $E-AD-F$ 为 30° ,

$$\text{则 } |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 即 } \frac{|4 - 2\lambda|}{2 \times \sqrt{\frac{7}{3}\lambda^2 - 4\lambda + 4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 即 } 3\lambda^2 + 4\lambda - 4 = 0$$

则 $\lambda = -2$ (舍) 或 $\lambda = \frac{2}{3}$.

所以 λ 的值为 $\frac{2}{3}$.

22. 解: (1) 因为 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$,

所以 $ac \cos B + 2ab \cos C - bc \cos A = 0$

$$\text{即 } ac \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} + 2ab \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} - bc \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = 0,$$

整理可得 $c^2 = 2a^2$, 即 $c = \sqrt{2}a$,

则 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$.

(2) $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}a^2 \sin B$, 由余弦定理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 3a^2 - 2\sqrt{2}a^2 \cos B$,

$$\text{所以 } \frac{2S}{b^2} = \frac{\sqrt{2}a^2 \sin B}{3a^2 - 2\sqrt{2}a^2 \cos B} = \frac{\sqrt{2} \sin B}{3 - 2\sqrt{2} \cos B},$$

令 $\frac{2S}{b^2} = y > 0$, 即 $\frac{\sqrt{2} \sin B}{3 - 2\sqrt{2} \cos B} = y$,

可得 $3y = \sqrt{2} \sin B + 2\sqrt{2}y \cos B = \sqrt{2 + 8y^2} \sin(B + \varphi) \leq \sqrt{2 + 8y^2}$, φ 为锐角, 且 $\tan \varphi = 2y$,

所以 $9y^2 \leq 2 + 8y^2$, 解得 $0 < y \leq \sqrt{2}$, 此时 $\tan \varphi = 2\sqrt{2}$, 当 $B = \frac{\pi}{2} - \varphi$ 时, y 取得最大值 $\sqrt{2}$.

故 $\frac{2S}{b^2}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$.

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址：
www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜



自主选拔在线