

## 高三地理参考答案、提示及评分细则

1. C 与①区域相比,②区域大部分位于西部低山丘陵地区,土地价格低,养殖成本低,机械化程度低,科技水平低;①区域位于东部沿海地区,养殖历史更为悠久,经验丰富。
2. A ②区域以丘陵为主,水土流失严重,发展种桑养蚕可以增加地表植被覆盖率,减轻石漠化。
3. D “东桑西移”是将①区域部分技术含量低的环节向②区域转移,利于①区域进行产业结构优化调整,扩大经济发展规模。
4. D 科特迪瓦大量农产品需经阿比让出口,经济腹地广;阿比让海运发达,河运不发达。
5. C 布瓦凯位于科特迪瓦的中心位置,且位于交通干线上,地理位置优越,可以从国内大范围获取工业原料,使其成为了可可加工中心。
6. A 科特迪瓦经济较为落后,资金不足,可可加工生产规模小,产品市场需求小,加之科技落后,加工水平低、能力不足,导致其可可加工率低;提高可可加工率,科特迪瓦应扩大消费市场,加大农业技术投入,提高可可加工水平。
7. C 分析可知,与修建铁路、公路两座大桥相比,建一座荆州长江公铁大桥的技术要求较高,建设难度较大,工程进度较慢,但可以减少占用土地,节约建设投资。
8. B 通过浩吉铁路的走向和重载的性质可知,浩吉铁路主要是将内蒙古等地的煤炭资源运输到华中地区,煤炭运出产地后可通过周边线路逐渐投放到沿线市场,运量不断减少,荆州以南地区低山丘陵、河湖众多,交通建设难度大,为了充分发挥铁路的运输潜力,荆州以南段主要运行运输旅客的动车组列车。
9. B 北京时间 2022 年 11 月 15 日 9 时 38 分(120°E)卫星发射,此时 25°W 约为 0 时,B 正确,D 错误;11 月份北半球处于冬半年,北极圈内有极夜现象,南极圈内有极昼现象,A、C 错误。
10. C 发射当日与冬至日相差 37 天,太阳直射点大约需移动  $10^{\circ}$ (每月移动约  $8^{\circ}$ ),所以发射当日太阳直射点大概位于  $13^{\circ}\text{S}$ ,所以酒泉在卫星发射当日的正午太阳高度为  $90^{\circ} - |39.7^{\circ} + 13^{\circ}| \approx 37^{\circ}$ 。
11. D 菲尔德斯海峡受盛行西风影响大,且海域狭长,狭管效应显著,风力强劲,搅动海水,导致海浪大。
12. A 近年来,全球气候变暖,气温升高,冰盖消融量增大,柯林斯冰盖面积不断缩小。
13. B 由图可知,长城站选址在菲尔德斯半岛东部海岸,沿海地形平坦,临近长城湾,利于船只登陆和巨轮锚泊;附近海域生物资源丰富,便于开展科学研究,科研价值大;菲尔德斯半岛自然条件好,是南极最湿润的地方,但因其纬度高,年均气温仍低于  $0^{\circ}\text{C}$ ;长城站位于  $62^{\circ}\text{S}$  附近,不会出现极夜现象。
14. B 由图可知,天山山脉相对高度大,不同海拔气候条件差异大,垂直自然带谱丰富,可以容纳世界多个分布区的地衣

生存,地衣类型多样。

15. A 结合所学知识分析可知,a自然带为山地荒漠草原带,b自然带为针叶林(云杉林)带,c自然带为山地草甸草原带,d自然带为高山草甸带。地衣植物虽然对环境的适应性强,但对养分、水分和气温的要求苛刻,a自然带为山地荒漠草原带,水分条件差,导致其几乎没有地衣分布。来源:高三答案公众号
16. (1)位于黄河干流,径流量大;位于深山峡谷地区,地势落差大;征地移民少,土地淹没损失小;河床狭窄,工程量小等。(每条1分,答对3条得3分,共3分)
- (2)位于高寒地区,气候环境恶劣;位于深山峡谷地区,地质结构复杂;河道流量大、流速快,截流难度大等。(每条2分,共6分)
- (3)提供能源,带动相关产业发展,促进经济发展;增加就业岗位,缓解就业压力;清洁能源比重上升,利于优化能源结构和维护国家能源安全;推进我国“碳达峰、碳中和”目标的实现等。(每条2分,共8分)
17. (1)台湾岛西部流经河流较多,西部丘陵和平原为疏松沉积层,夏季多暴雨,山高水急,常引发泥石流,挟带大量泥沙输入邻近海域,水质较为浑浊;多条河流入海,河流携带大量生产生活污染物,污染沿海水质;西部海岸主要为沙滩或泥滩,缺乏硬质基岩,不利于珊瑚的生长等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
- (2)全球气候变暖,部分海域温度升高,不利于珊瑚生长;海水酸化导致珊瑚生长减缓;海洋污染,海水富营养化严重,影响珊瑚繁殖;台风搅动海水,导致珊瑚死亡;海岸带开发、潜水等人为活动直接或间接地对珊瑚生长造成影响等。(每条2分,答对3条得6分,共6分)
- (3)减少二氧化碳排放,减缓全球变暖的趋势;控制周边地区污染物排放,提高水质;在重点区域建立珊瑚自然保护区,减少人为活动的破坏;加强珊瑚保护的宣传教育,提高民众环保意识等。(每条2分,答对3条得6分,共6分)
18. (1)差异:北部降水量多于南部(或南部降水量少于北部)。(2分)理由:中央谷地主要位于地中海气候区,降水主要来源于西风水汽,北部纬度较高,受西风水汽影响较大,(3分)且受副热带高气压带控制时间较短,降水时间较长,降水量较大。(3分) 或中央谷地主要位于地中海气候区,降水主要来源于西风水汽,南部纬度较低,受西风水汽影响较小,(3分)且受副热带高气压带控制时间较长,降水时间较短,降水量较少。(3分)
- (2)中央谷地西部位于海岸山脉的背风坡,全年降水稀少;河流补给水源较为单一,以春季的冰雪融水补给为主,其他季节河流水量少,甚至断流,形成季节性河流。(每条3分,共6分)
- (3)秋末至冬季为谷地雨季,空气中水汽含量大;地形较为封闭,水汽不易扩散;秋末至冬季的夜晚长、温度低,湿润气流进入谷地下沉增温,与较冷地面相遇易形成大雾。(每条4分,答对2条得8分,共8分)

## 关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：[www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



 微信搜一搜

 自主选拔在线

