

北京市东城区 2016—2017 学年度第二学期高三综合练习(二)

2017.5


数学(文科)

本试卷共 4 页,共 150 分.考试时长 120 分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

第 I 卷(选择题 共 40 分)

一、选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项)

1. 已知全集 U 是实数集 \mathbf{R} . 右边的韦恩图表示集合 $M = \{x | x > 2\}$ 与 $N = \{x | 1 < x < 3\}$ 的关系,那么阴影部分所表示的集合可能为



- A. $\{x | x < 2\}$ B. $\{x | 1 < x < 2\}$
 C. $\{x | x > 3\}$ D. $\{x | x \leq 1\}$
2. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (x, 4)$, 且 $a \perp b$, 那么 x 的值为
 A. -2 B. -4 C. -8 D. -16
3. 下列函数既是奇函数,又在区间 $[-1, 1]$ 上单调递减的是
 A. $f(x) = \sin x$ B. $f(x) = |x+1|$ C. $f(x) = -x$ D. $f(x) = \cos x$


4. 在平面直角坐标系中,不等式组 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x + y \leq 2, \\ x \leq y \end{cases}$ 所表示的平面区域的面积为

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
5. 已知 $x, y \in \mathbf{R}$, 那么“ $x > y$ ”的充分必要条件是
 A. $2^x > 2^y$ B. $\lg x > \lg y$ C. $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$ D. $x^2 > y^2$

6. 已知直线 $x + y = m (m > 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相交于 P, Q 两点,且 $\angle POQ = 120^\circ$ (其中 O 为原点),那么 m 的值是

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$

7. 日晷是中国古代利用日影测得时刻的一种计时工具,又称“日规”.通常由铜制的指针和石制的圆盘组成,铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘中心,石制的圆盘叫做“晷面”,它放在石台上,其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻.利用日晷计时的方法是人类在天文计时领域的重大发明,这项发明被人类沿用达几千年之久.下图是一位游客在故宫中拍到的一个日晷照片,假设相机镜头正对的方向为正方向,则根据图片判断此日晷的侧(左)视图可能为



8. 已知甲、乙两个容器,甲容器容量为 x ,装满纯酒精,乙容器容量为 z ,其中装有体积为 y 的水($x, y < z$, 单位:L). 现将甲容器中的液体倒入乙容器中,直至甲容器中液体倒完或乙容器盛满,搅拌使乙容器中两种液体充分混合,再将乙容器中的液体倒入甲容器中直至倒满,搅拌使甲容器中液体充分混合,如此称为一次操作,假设操作过程中溶液体积变化忽略不计. 设经过 $n(n \in \mathbb{N}^+)$ 次操作之后,乙容器中含有纯酒精 a_n (单位:L), 下列关于数列 $\{a_n\}$ 的说法正确的是

- A. 当 $x=y=a$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 有最大值 $\frac{a}{2}$
 B. 设 $b_n = a_{n+1} - a_n (n \in \mathbb{N}^+)$, 则数列 $\{b_n\}$ 为递减数列
 C. 对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$, 始终有 $a_n \leq \frac{xy}{z}$
 D. 对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$, 都有 $a_n \leq \frac{xy}{x+y}$

第 II 卷 (非选择题 共 110 分)

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

9. 已知 $\triangle ABC$ 三内角 A, B, C 对应的边长分别为 a, b, c , 且 $B = \frac{2\pi}{3}$, 又边长 $b = 3c$, 那么 $\sin C =$ _____.

10. 已知 $\frac{1}{1+i} = \frac{1}{2} - ni$, 其中 n 是实数, i 是虚数单位, 那么 $n =$ _____.


11. 下面茎叶图记录了甲、乙两班各六名同学一周的课外阅读时间(单位:小时), 已知甲班数据的平均数为 13, 乙班数据的中位数为 17, 那么 x 的位置应填 _____, y 的位置应填 _____.

甲			乙		
8	9		0	7	6
3	x	5	1	9	y 6
		0	2		1

12. 已知双曲线 G 以原点 O 为中心, 过点 $(\sqrt{5}, 4)$, 且以抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为右顶点, 那么双曲线 G 的方程为 _____.

13. 已知函数 $f(x) = \ln x + 2x - 6$ 的零点在区间 $(\frac{k}{2}, \frac{k+1}{2})$ ($k \in \mathbb{Z}$) 内, 那么 $k =$ _____.

14. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为对角线 B_1D_1 上的一点, M, N 为对角线 AC 上的两个动点, 且线段 MN 的长度为 1.



- (1) 当 N 为对角线 AC 的中点且 $DE = \sqrt{2}$ 时, 则三棱锥 $E-DMN$ 的体积是 _____;
 (2) 当三棱锥 $E-DMN$ 的体积为 $\frac{1}{3}$ 时, 则 $DE =$ _____.



三、解答题(本大题共 6 小题,共 80 分.解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程)

15. (本小题 13 分)

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -2, a_{12} = 20$.

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n ;

(II) 若 $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 求数列 $\{3^{b_n}\}$ 的前 n 项和.

16. (本小题 13 分)

函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$ ($A > 0, \omega > 0$) 的最大值为 2, 它的最小正周期为 2π .

(I) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(II) 若 $g(x) = \cos x \cdot f(x)$, 求 $g(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$ 上的最大值和最小值.

17. (本小题 13 分)

某单位附近只有甲、乙两个临时停车场, 它们各有 50 个车位, 为了方便市民停车, 某互联网停车公司对这两个停车场, 在某些固定时刻的剩余停车位进行记录, 如下表:

时间 \ 停车场	8 点	10 点	12 点	14 点	16 点	18 点
甲停车场	10	3	12	6	12	17
乙停车场	13	4	3	2	6	19

如果表中某一时刻剩余车位数低于该停车场总车位的 10%, 那么当车主驱车抵达单位附近时, 该公司将会向车主发出停车场饱和警报.

(I) 假设某车主在以上六个时刻抵达单位附近的可能性相同, 求他收到甲停车场饱和警报的概率;

(II) 从这六个时刻中任选一个时刻, 求甲停车场比乙停车场剩余车位数少的概率;


(III) 当乙停车场发出饱和警报时, 求甲停车场也发出饱和警报的概率.



18. (本小题 14 分)

如图, 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 侧面 ADD_1A_1 和侧面 CDD_1C_1 都是矩形, $BC \parallel AD$, $\triangle ABD$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别为 AD, A_1D_1 的中点.

- (I) 求证: $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$;
 (II) 求证: 平面 $A_1BE \perp$ 平面 ADD_1A_1 ;
 (III) 若 $CF \parallel$ 平面 A_1BE , 求棱 BC 的长度.



19. (本小题 13 分)

设函数 $f(x) = (x-a) \cdot e^x, a \in \mathbf{R}$.

- (I) 当 $a=1$ 时, 试求 $f(x)$ 的单调增区间;
 (II) 试求 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最大值;
 (III) 当 $a=1$ 时, 求证: 对于 $\forall x \in [-5, +\infty), f(x) + x + 5 \geq -\frac{6}{e}$ 恒成立.

20. (本小题 14 分)

已知椭圆 $E: mx^2 + y^2 = 1 (m > 0)$.

- (I) 若椭圆 E 的右焦点坐标为 $(\sqrt{3}, 0)$, 求 m 的值;
 (II) 由椭圆 E 上不同三点构成的三角形称为椭圆的内接三角形. 若以 $B(0, 1)$ 为直角顶点的椭圆 E 的内接等腰直角三角形恰有三个, 求 m 的取值范围.



北京市东城区 2016—2017 学年度第二学期高三综合练习(二)

2017.5

高三数学(文科)参考答案及评分标准

一、选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1.D 2.C 3.C 4.A 5. A 6.B 7.D 8.D

二、填空题(本大题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分)

9. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 10. $\frac{1}{2}$ 11. 3, 8 12. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 13. 5 14. $\frac{\sqrt{3}}{9}; \sqrt{6}$

注:两个空的填空题第一个空填对得 3 分,第二个空填对得 2 分.

三、解答题(本大题共 6 小题,共 80 分)

15. (本小题 13 分)

解:(I)因为 $a_n = -2 + (n-1)d$,

所以 $a_{12} = -2 + 11d = 20$.

于是 $d = 2$,

所以 $a_n = 2n - 4$.

(II)因为 $a_n = 2n - 4$,

所以 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(2n-6)}{2} = n(n-3)$.

于是 $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = n - 3$,

令 $c_n = 3^{b_n}$, 则 $c_n = 3^{n-3}$.

显然数列 $\{c_n\}$ 是等比数列,且 $c_1 = 3^{-2}$, 公比 $q = 3$.

所以数列 $\{3^{b_n}\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{c_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{3^n - 1}{18}$. 13 分

16. (本小题 13 分)

解:(I)由已知 $f(x)$ 最小正周期为 2π ,

所以 $\frac{2\pi}{\omega} = 2\pi$, 解得 $\omega = 1$.

因为 $f(x)$ 的最大值为 2,

所以 $A = 2$.

所以 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = 2\sin(x + \frac{\pi}{6})$. 5 分

(II)因为 $f(x) = 2\sin(x + \frac{\pi}{6}) = 2\sin x \cos \frac{\pi}{6} + 2\cos x \sin \frac{\pi}{6}$
 $= \sqrt{3}\sin x + \cos x$,

所以 $g(x) = \cos x \cdot f(x) = \sqrt{3}\sin x \cos x + \cos^2 x = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x + \frac{1 + \cos 2x}{2}$

$= \sin(2x + \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}$.



因为 $-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, 所以 $-\frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2\pi}{3}$.

于是, 当 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $g(x)$ 取得最大值 $\frac{3}{2}$;

当 $2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6}$, 即 $x = -\frac{\pi}{6}$ 时, $g(x)$ 取得最小值 0. 13 分

17. (本小题 13 分)

解: (I) 事件“该车主收到甲停车场饱和警报”只有 10 点这一种情况, 该车主抵达单位共有六种情况,

所以该车主收到甲停车场饱和警报的概率为 $P = \frac{1}{6}$ 4 分

(II) 事件“甲停车场比乙停车场剩余车位数少”有 8 点、10 点、18 点三种情况, 一共有六个时刻,

所以甲停车场比乙停车场剩余车位数少的概率为 $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 9 分

(III) 事件“乙停车场发出饱和警报”有 10 点、12 点、14 点三种情况,

事件“甲停车场也发出饱和警报”只有 10 点一种情况,

所以当乙停车场发出饱和警报时, 甲停车场也发出饱和警报的概率为 $P = \frac{1}{3}$

18. (本小题 14 分)

证明: (I) 因为侧面 ADD_1A_1 和侧面 CDD_1C_1 都是矩形,

所以 $DD_1 \perp AD$, 且 $DD_1 \perp CD$.

因为 $AD \cap CD = D$,

所以 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$ 4 分

(II) 因为 $\triangle ABD$ 是正三角形, 且 E 为 AD 中点,

所以 $BE \perp AD$.

因为 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$,

而 $BE \subset$ 平面 $ABCD$,

所以 $BE \perp DD_1$.

因为 $AD \cap DD_1 = D$,

所以 $BE \perp$ 平面 ADD_1A_1 .

因为 $BE \subset$ 平面 A_1BE ,

所以平面 $A_1BE \perp$ 平面 ADD_1A_1 10 分

解: (III) 因为 $BC \parallel AD$,

而 F 为 A_1D_1 的中点,

所以 $BC \parallel A_1F$.

所以 B, C, F, A_1 四点共面.

因为 $CF \parallel$ 平面 A_1BE ,

而平面 $BCFA_1 \cap$ 平面 $A_1BE = A_1B$,

所以 $CF \parallel A_1B$.



所以四边形 $BCFA_1$ 是平行四边形.

所以 $BC=FA_1=\frac{1}{2}AD=1$ 14 分

19. (本小题 13 分)

解: (I) 由 $f(x)=(x-a) \cdot e^x$, 得 $f'(x)=(x-a+1) \cdot e^x$.

当 $a=1$ 时, $f'(x)=x \cdot e^x$, 令 $f'(x)>0$, 得 $x>0$,

所以 $f(x)$ 的单调增区间为 $(0, +\infty)$ 4 分

(II) 令 $f'(x)=0$, 得 $x=a-1$.

所以当 $a-1 \leq 1$ 时, $x \in [1, 2]$ 时 $f'(x) \geq 0$ 恒成立, $f(x)$ 单调递增;

当 $a-1 \geq 2$ 时, $x \in [1, 2]$ 时 $f'(x) \leq 0$ 恒成立, $f(x)$ 单调递减;

当 $1 < a-1 < 2$ 时, $x \in [1, a-1]$ 时 $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 单调递减;

$x \in (a-1, 2)$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

综上, 无论 a 为何值, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x)$ 最大值都为 $f(1)$ 或 $f(2)$.

$f(1)=(1-a)e, f(2)=(2-a)e^2$,

$f(1)-f(2)=(1-a)e-(2-a)e^2=(e^2-e)a-(2e^2-e)$.

所以当 $a \geq \frac{2e^2-e}{e^2-e} = \frac{2e-1}{e-1}$ 时, $f(1)-f(2) \geq 0, f(x)_{\max} = f(1) = (1-a)e$.

当 $a < \frac{2e^2-e}{e^2-e} = \frac{2e-1}{e-1}$ 时, $f(1)-f(2) < 0, f(x)_{\max} = f(2) = (2-a)e^2$ 10 分

(III) 令 $h(x)=f(x)+x$.

所以 $h'(x)=xe^x+1$.

所以 $h''(x)=(x+1)e^x$.

令 $h''(x)=(x+1)e^x=0$,

解得 $x=-1$,

所以当 $x \in [-5, -1)$ 时, $h''(x) < 0, h'(x)$ 单调递减;

当 $x \in [-1, +\infty)$ 时, $h''(x) > 0, h'(x)$ 单调递增.

所以当 $x=-1$ 时, $h'(x)_{\min} = h'(-1) = 1 - \frac{1}{e} > 0$.

所以函数 $h(x)$ 在 $[-5, +\infty)$ 上单调递增.

所以 $h(x) \geq h(-5) = \frac{6}{e^5} - 5$.

所以 $\forall x \in [-5, +\infty), f(x)+x+5 \geq -\frac{6}{e^5}$ 恒成立. 13 分

20. (本小题 14 分)

解: (I) 椭圆 E 的方程可以写成 $\frac{x^2}{m} + y^2 = 1$, 因为焦点 $(\sqrt{3}, 0)$ 在 x 轴上,

所以 $a^2 = \frac{1}{m}, b^2 = 1$,

$c^2 = a^2 - b^2 = \frac{1}{m} - 1 = \sqrt{3}^2 = 3$, 求得 $m = \frac{1}{4}$ 4 分



(II) 设椭圆 E 内接等腰直角三角形的两直角边分别为 BA, BC , 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$

显然 BA 与 BC 不与坐标轴平行, 且 $k_{BA} \cdot k_{BC} = -1 < 0$,

所以可设直线 BA 的方程为 $y = kx + 1 (k > 0)$, 则直线 BC 的方程为 $y = -\frac{1}{k}x + 1$.

$$\text{由 } \begin{cases} mx^2 + y^2 = 1, \\ y = kx + 1 \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 得到 } (m+k^2)x^2 + 2kx = 0,$$

$$\text{所以 } x_1 = \frac{-2k}{m+k^2}.$$

$$\text{求得 } |BA| = \sqrt{k^2+1} \cdot |x_1 - 0| = \sqrt{k^2+1} \cdot \frac{2k}{m+k^2} = \frac{2k}{m+k^2} \sqrt{k^2+1},$$

$$\text{同理可求 } |BC| = \sqrt{\left(-\frac{1}{k}\right)^2+1} \cdot |x_2 - 0| = \sqrt{\left(-\frac{1}{k}\right)^2+1} \cdot \frac{|-2\left(-\frac{1}{k}\right)|}{m+\left(-\frac{1}{k}\right)^2} = \frac{2}{m+k^2+1} \sqrt{k^2+1}.$$

因为 $\triangle ABC$ 为以 $B(0, 1)$ 为直角顶点的等腰直角三角形,

所以 $|BA| = |BC|$.

$$\text{所以 } \frac{2k}{m+k^2} \sqrt{k^2+1} = \frac{2}{m+k^2+1} \sqrt{k^2+1}.$$

整理得 $mk^3 - k^2 + k - m = 0$, 所以 $(mk^3 - m) - (k^2 - k) = 0, m(k^3 - 1) - (k^2 - k) = 0$.

由此 $m(k-1)(k^2+k+1) - k(k-1) = 0, (k-1)[mk^2 + (m-1)k + m] = 0$,

所以 $k=1$ 或 $mk^2 + (m-1)k + m = 0$.

设 $f(k) = mk^2 + (m-1)k + m$,

因为以 $B(0, 1)$ 为直角顶点的椭圆内接等腰直角三角形恰有三个,

所以关于 k 的方程 $mk^2 + (m-1)k + m = 0$ 有两个不同的正实根 x_1, x_2 , 且都不为 1.

$$\text{所以 } \begin{cases} f(1) \neq 0 \Rightarrow m + (m-1) + m \neq 0 \Rightarrow m \neq \frac{1}{3}, \\ x_1 + x_2 > 0 \Rightarrow -\frac{m-1}{m} > 0 \Rightarrow 0 < m < 1, \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \Rightarrow 1 > 0, \text{ 恒成立,} \\ \Delta > 0 \Rightarrow \Delta = (m-1)^2 - 4m^2 > 0 \Rightarrow -1 < m < \frac{1}{3}. \end{cases}$$

解得实数 m 的取值范围是 $(0, \frac{1}{3})$ 14 分



自主招生
ZZZS.COM



WWW.ZZZS.COM

扫描二维码，关注自主招生在线微信！

查看更多自主招生相关资讯！



自主招生在线
WWW.ZZZS.COM



自主招生在线
WWW.ZZZS.COM