

张家口市 2023 年高三年级第二次模拟考试

数学参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	D	C	D	A	B	C	D	ABC	BC	AB	BC

1. C 解析:由题意可得 $A=(2,4), B=(-\infty, 3)$, 于是, $A \cap B=(2, 3)$, 因此 $(\complement_{\mathbb{R}}A) \cup (\complement_{\mathbb{R}}B) = \complement_{\mathbb{R}}(A \cap B) = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$, 故选 C.

[命题意图] 本题考查集合的运算及简单不等式的解法, 考查学生的数学运算素养.

2. D 解析:由题意可得 $z=1-i$, 于是, $\frac{1+i}{z} = \frac{1+i}{1-i} = i$, 故 $\left(\frac{1+i}{z}\right)^3 = i^3 = -i$, 故选 D.

[命题意图] 本题考查复数的几何意义以及复数的除法、乘方运算, 考查学生的数学运算素养.

3. C 解析:利用圆心距 d 和半径 $r=\sqrt{2}$ 的关系来确定直线与圆的位置关系. 由题意可得 $x_0^2 + y_0^2 = 2$, 于是 $d = \frac{2}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = r$, 所以, 两者相切. 故选 C.

[命题意图] 本题考查直线与圆的位置关系的判定, 考查学生的数学运算和逻辑推理素养.


4. D 解析:由向量数量积的性质可得 $|2a-b|^2 = (2a-b)^2 = 4a^2 + b^2 - 4a \cdot b$. 于是, $-4a \cdot b = 2$, 即 $\frac{3}{2}x \cdot (-1) + \frac{1}{2}x = -\frac{1}{2}$, 所以, $x = \frac{1}{2}$. 故选 D.

[命题意图] 本题考查向量的运算及数量积的性质, 考查学生的逻辑推理和数学运算素养.

5. A 解析:设地球的公转周期为 $5T$, 则火星的公转周期为 $9T$. 设地球、火星运行轨道的半长轴分别为 m, n , 则 $\frac{m^3}{25T^2} = \frac{n^3}{81T^2}$, 于是, $\frac{m}{n} = \sqrt[3]{\frac{25}{81}}$. 故选 A.

[命题意图] 本题考查函数建模、分数指数幂与根式的互化以及阅读理解能力, 考查学生的数学运算和数学建模素养.

6. B 解析:在纵断面内, 以反射镜的顶点(即抛物线的顶点)为坐标原点, 过顶点垂直于灯口直径的直线为 x 轴, 建立直角坐标系, 如图, 由题意可得 $A(40, 40)$. 设抛物线的标准方程为 $y^2 = 2px (p > 0)$, 于是 $40^2 = 2p \cdot 40$, 解得 $p = 20$. 所以, 抛物线的焦点到顶点的距离为 $\frac{p}{2} = 10$, 即光源到反射镜顶点的距离为 10 cm. 故选 B.



[命题意图] 本题考查抛物线的标准方程和几何性质, 考查学生阅读理解和将实际问题数学化能力.

7. C 解析:根据欧拉函数的定义可得 $a_1 = \varphi(2) = 1, a_2 = \varphi(2^2) = 2, a_3 = \varphi(2^3) = 4, a_4 = \varphi(2^4) = 8$, 一般地, $a_n = \varphi(2^n) = 2^{n-1}$. 事实上, $\varphi(2^n)$ 表示从 1 到 2^n 的正整数中, 与 2^n 互质的正整数的个数, 相当于去掉从 1 到 2^n 的正整数中所有 2 的倍数的个数(共 2^{n-1} 个数), 因此, $a_n = \varphi(2^n) = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$. 所以, $S_{10} = 1 +$

$2+4+\dots+2^9=1023$, 故选 C.

[命题意图] 本题考查数学新定义及数列求和, 考查学生灵活运用新定义分析和解决问题的能力, 考查学生逻辑推理和数学运算素养.

8. D **解析:** 由题意可得, 函数 $f(x)$ 为增函数. 若 $f(y_0) > y_0$, 则 $f(f(y_0)) > f(y_0) > y_0$; 同理, 若 $f(y_0) < y_0$, 则 $f(f(y_0)) < f(y_0) < y_0$, 均与题设条件不符. 由 $f(f(y_0)) = y_0$ 可得 $f(y_0) = y_0$, 且 $y_0 \in [0, 1]$. 因此, 关于 x 的方程 $\sqrt{2\ln(x+1)+x-m} = x$ 在 $[0, 1]$ 上有解, 整理得 $2\ln(x+1)-x^2+x=m$ 在 $[0, 1]$ 上有解. 设 $g(x) = 2\ln(x+1)-x^2+x, x \in [0, 1]$, 则 $g'(x) = \frac{2}{x+1} - 2x + 1$ 为 $[0, 1]$ 上的减函数, 注意到 $g'(1) = 0$, 故 $g'(x) \geq 0$, 从而函数 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增. 所以, $g(x) \in [g(0), g(1)] = [0, 2\ln 2]$. 因此, 实数 m 的取值范围是 $[0, 2\ln 2]$. 故选 D.

[命题意图] 本题考查函数的图象与性质、函数的零点的综合运用, 考查学生的逻辑推理和数学运算素养.

9. ABC **解析:** 显然 a 不是最小的数, 也不是最大的数. 由于上四分位数即第 75 百分位数, 于是 $18 \times 75\% = 13.5$, 将这些数据按照从小到大排列后, 第 14 个数为上四分位数. 而除去 a 后, 从小到大排列得到的第 13 个数为 83, 所以 a 的可能取值为 83, 84, 85. 故选 ABC.


[命题意图] 本题考查统计中的百分位数, 考查学生的数据分析和数学运算素养.

10. BC **解析:** 由题意, $f(x) = \cos(2x - \varphi) + \frac{1}{2}$. 将其图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到函数 $g(x) = \cos\left[2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \varphi\right] + \frac{1}{2} = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3} - \varphi\right) + \frac{1}{2}$, 而 $g(x) - g(-x) = 0$ 恒成立, 即函数 $y = g(x)$ 为偶函数, 于是 $\frac{\pi}{3} - \varphi = k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以, $\varphi = \frac{\pi}{3}$. 因此, 函数 $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{2}, g(x) = \cos 2x + \frac{1}{2}$. 所以, 函数 $g(x)$ 的最小正周期为 π , A 错误; 由 $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$ 时, $\cos 2x = 0$, 因此, 函数 $g(x)$ 的图象的对称中心为 $\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \frac{1}{2}\right) (k \in \mathbf{Z})$, B 正确; 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ 时, $-\frac{\pi}{3} \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{3}$, 所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的最小值为 1, 最大值为 $\frac{3}{2}$, C 正确; 令 $2x - \frac{\pi}{3} = \pi + 2k\pi$, 即 $x = \frac{2\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 为函数的极小值点, D 错误. 故选 BC.

[命题意图] 本题考查三角函数的恒等变换、三角函数的图象性质与三角函数图象的变换, 考查学生的代数变形能力和数学运算素养.

11. AB **解析:** 当 P 在对角线 BD 上运动时, $BD \parallel$ 平面 AB_1D_1 , 从而点 P 到平面 AB_1D_1 的距离为定值, 从而三棱锥 $P-AB_1D_1$ 的体积为定值, 即三棱锥 $A-PB_1D_1$ 的体积为定值, A 正确; 以 D 为原点, DA, DC, DD_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $D_1(0, 0, 1)$, 由 P 在对角线 BD 上运动, $B_1(1, 1, 1), C(0, 1, 0), A(1, 0, 0), C_1(0, 1, 1), P(m, m, 0) (0 \leq m \leq 1)$, 于是 $\overrightarrow{B_1C} = (-1, 0, -1), \overrightarrow{D_1P} = (m, m, -1)$. 假设存在点 P 满足异面直线 D_1P 与 B_1C 所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 因此, $\frac{1}{2} = \left| \frac{-m+1}{\sqrt{2m^2+1} \cdot \sqrt{2}} \right|$, 解得 $m = \frac{1}{4}$. 所以, 异面直线 D_1P 与 B_1C 所成角可以取到 $\frac{\pi}{3}$, B 正确; 注意到直线 $AC_1 \perp$ 平面 A_1BD , 所以, 平面 A_1BD 的一个法向量为 $\overrightarrow{AC_1} = (-1, 1, 1)$, 于是, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \left| \frac{-m+m-1}{\sqrt{2m^2+1} \cdot \sqrt{3}} \right|$, 解得 $m \in \emptyset$. 所以, C 错误; 注意到点 P 到棱 AA_1 的距离为 PA , 过点 P 作 BC 的垂线, 垂足为 H , 则点 P 到平面 BCC_1B_1 的距离为 PH , 在平面

$ABCD$ 内, 动点 P 到定点 A 的距离与到定直线 BC 的距离之比为 2, 即动点 P 的轨迹在双曲线上, D 错误, 故选 AB .



[命题意图] 本题考查立体几何中动点轨迹, 异面直线所成角、线面角的计算, 考查利用空间向量处理空间角, 利用圆锥曲线的定义确定立体几何中动点的轨迹, 考查学生的逻辑推理、直观想象和数学运算素养.

12. BC **解析:** 对于选项 A , $\forall \epsilon > 0$, 令 $x_1 = n, x_2 = n + \frac{1}{n}$, 当 n 充分大时, $x_2 - x_1 = \frac{1}{n} < \delta$; 另一方面,

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| n^2 - \left(n + \frac{1}{n} \right)^2 \right| = 2 + \frac{1}{n^2} > 2, \text{ 不满足 } |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon, \text{ 因此, 函数 } f(x) = x^2 \text{ 在}$$

$[0, +\infty)$ 上不一致连续. 对于选项 B , 令 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$, 则 $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} <$

$$\frac{|x_1 - x_2|}{2}, \forall \epsilon > 0, \text{ 取 } \delta = 2\epsilon, \text{ 当 } x_1, x_2 \in [1, +\infty), \text{ 且 } |x_1 - x_2| < \delta \text{ 时, } |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| < \frac{\delta}{2} = \epsilon, \text{ 所以, 函}$$

数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 对于选项 C , $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon > 0, \forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 当

$$|x_1 - x_2| < \delta \text{ 时, 有 } |\sin x_1 - \sin x_2| = 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \left| \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|x_1 - x_2|}{2} <$$

$\delta = \epsilon$, 因此, 函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. 利用题目给出的一致连续的定义, 我们可以得到函数 $f(x)$ 在区间 I 不一致连续的定义: 对给定的某正数 ϵ_0 , 不论 δ 取值多么小, 总至少有 $x_1, x_2 \in I$, 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 但 $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon_0$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 I 不一致连续. 对于选项 D ,

对给定的 $\epsilon_0 = 1, \forall \delta > 0, \delta$ 充分小, 不妨设 $\delta < \frac{1}{2}$, 取 $x_1 = \delta, x_2 = \frac{\delta}{2}$, 则 $|x_1 - x_2| = \frac{\delta}{2} < \delta$, 但

$$\left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = \frac{1}{\delta} > 1, \text{ 这说明, 函数 } f(x) = \frac{1}{x} \text{ 在区间 } (0, +\infty) \text{ 上不一致连续. 故选 } BC.$$

[命题意图] 本题考查学生阅读理解能力及逻辑推理素养, 考查学生灵活运用所学知识解决问题的能力.

13. -160 **解析:** 由题意可得 $2^n = 64$, 于是, $n = 6$. 设第 $r + 1$ 项为常数项, 则 $C_n^r x^{6-r} \left(-\frac{2}{x} \right)^r =$

$$(-2)^r C_n^r x^{6-2r}, \text{ 即 } 6 - 2r = 0, \text{ 解得 } r = 3. \text{ 所以, 该展开式的常数项为 } (-2)^3 C_6^3 = -160.$$

[命题意图] 本题考查二项展开式通项公式以及二项式系数的性质, 考查学生的数学运算素养.

14. 1 **解析:** 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$. 由复合函数的单调性可知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增. 而 $f(0) = 4, f(2) = 1$. 所以, 函数 $f(x)$ 的最小值为 1.


[命题意图] 本题考查函数的单调性及应用求最值, 考查学生的逻辑推理和数学运算素养.

15. 1 **解析:** 由题意可得, 点 C 在抛物线 $y = x^2 - ax - 3 (a \in \mathbf{R})$ 上, 且点 D 在 x 轴上方, 即 $b > 0$. 设过 A, B, C 三点的圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. 令 $y = 0$, 则有 $x^2 + Dx + F = 0$; 令 $x = 0$, 则有 $y^2 + Ey + F = 0$. 设 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则 x_1, x_2 也为方程 $x^2 + Dx + F = 0$ 的根, 由韦达定理可得,

$x_1 x_2 = F = -3$; 同理, $-3, b$ 为方程 $y^2 + Ey + F = 0$ 的根, 由韦达定理可得 $-3b = F$. 因此, $-3b = -3$, 即 $b = 1$.

[命题意图] 本题考查圆的定义及方程的应用, 考查学生的数学抽象能力和数学运算素养.

16. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ **解析:** 如图, 由 $\overrightarrow{PM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{NM}$, 可得 $\frac{|PN|}{|PM|} = \frac{1}{3}$, 又 $\frac{|PF_2|}{|PF_1|} = \frac{1}{3}$, 故 $NF_2 \parallel MF_1$, 且 $|MF_1| = 3|F_2N|$. 设 $|F_2N| = m$, 则 $|MF_1| = 3m$, 而 $|\overrightarrow{F_2M}| = 2|\overrightarrow{F_2N}|$, 于是 $|F_2M| = 2m$. 由椭圆的定义可知, $2a = |MF_1| + |MF_2| = 3m + 2m = 5m$, 即 $a = \frac{5m}{2}$. 延长 MF_1 交椭圆 C 于点 Q , 连接 QF_2 , 则由椭圆的对称性可知, $|QF_1| = |F_2N| = m$. 又 $|QF_1| + |QF_2| = 2a$, 故 $|QF_2| = 4m$, 即 $\triangle QMF_2$ 为等腰三角形, 于是, $\cos \angle QMF_2 = \frac{1}{4}$. 在 $\triangle MF_1F_2$ 中, 设 $|F_1F_2| = 2c$, 由余弦定理可得 $4c^2 = 9m^2 + 4m^2 - 2 \cdot 3m \cdot 2m \cdot \frac{1}{4} = 10m^2$, 即 $c = \frac{\sqrt{10}}{2}m$. 所以, 椭圆 C 的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\frac{\sqrt{10}}{2}m}{\frac{5}{2}m} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.



[命题意图] 本题考查椭圆的定义、几何性质、离心率的计算, 考查学生数形结合、逻辑推理、直观想象和数学运算素养.


17. **解:** (1) 由题意, 当 $n=1$ 时, $a_2 = 2S_1 + 2 = 2a_1 + 2 = 4$ (1分)
 当 $n \geq 2$ 时, $(n-1)a_n = 2S_{n-1} + 2$. 又 $na_{n-1} = 2S_n + 2 (n \in \mathbb{N}^*)$,
 所以, 当 $n \geq 2$ 时, 有 $na_{n-1} - (n-1)a_n = 2a_n$, 即 $\frac{a_{n-1}}{n+1} = \frac{a_n}{n}$ (3分)
 这表明从第二项起, 数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 是以 $\frac{a_2}{2} = 2$ 为首项的常数列, 即 $\frac{a_n}{n} = 2 (n \geq 2)$ (4分)
 所以, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \begin{cases} 1, & n=1, \\ 2n, & n \geq 2. \end{cases}$ (5分)
 (2) 由(1)可得, $b_1 = \frac{1}{a_1 a_2} = \frac{1}{4}$, $T_1 = b_1 = \frac{1}{4} < \frac{3}{8}$ (6分)
 当 $n \geq 2$ 时, $b_n = \frac{1}{a_n a_{n-1}} = \frac{1}{4n(n+1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$, (7分)
 所以, $T_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{4(n+1)} < \frac{3}{8}$.
 综上所述, 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $T_n < \frac{3}{8}$ (10分)

[命题意图] 本题考查利用递推关系确定数列的通项公式以及数列求和方法, 考查学生的逻辑推理能力和数学运算素养.

18. 解: (1) 由 $A+B+C=\pi$, 得 $\tan A = -\tan(B+C) = -\frac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \tan C}$,
 即 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$, (2分)
 又 $\tan A + \tan B + \tan C = \sqrt{3} \tan B \tan C$, 所以 $\tan A = \sqrt{3}$ (4分)
 因为 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$ (5分)
- (2) 由题意可得 $\lambda \geq \frac{b(c-b)}{a^2}$ 恒成立.
 由余弦定理可得 $\frac{1}{2} = \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, 于是 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$.
 所以 $bc - b^2 = c^2 - a^2$, 则 $\frac{b(c-b)}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = \left(\frac{c}{a}\right)^2 - 1$, (7分)
 由正弦定理得 $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin C$ (8分)
 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, 则 $B+C = \frac{2\pi}{3}$, 且 $B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$, 故 $\frac{\pi}{6} < C < \frac{\pi}{2}$, (9分)
 所以 $\frac{1}{2} < \sin C < 1$, 所以 $\frac{c}{a} \in (\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3})$, (10分)
 因此, $\frac{b(c-b)}{a^2} \in (-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, (11分)
 于是, $\lambda \geq \frac{1}{3}$. 所以, 实数 λ 的取值范围是 $[\frac{1}{3}, +\infty)$ (12分)

[命题意图] 本题考查利用正弦定理、余弦定理解三角形问题, 考查边元结构的取值范围, 考查学生的逻辑推理和数学运算素养.

19. 解: (1) 由题意可得, $EF \parallel BC$, 又 $BC \subset$ 平面 ABC , $EF \not\subset$ 平面 ABC , 所以, $EF \parallel$ 平面 ABC (2分)
 又 $EF \subset$ 平面 AEF , 平面 AEF 与底面 ABC 的交线为 l , 所以, $EF \parallel l$ (3分)
 从而, $l \parallel BC$, 而 $BC \subset$ 平面 PBC , $l \not\subset$ 平面 PBC , 所以, $l \parallel$ 平面 PBC (4分)
- (2) 由(1)可知, 在底面 ABC 内过点 A 作 BC 的平行线, 即平面 AEF 与底面 ABC 的交线 l .
 由题意可得 $AC^2 + BC^2 = AB^2$, 即 $AC \perp BC$.
 故 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} AC \cdot BC = 4$.
 设点 P 到平面 ABC 的距离为 h , 则 $\frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3} Sh = \frac{1}{3} \times 4h$, 于是 $h = \sqrt{3}$ (6分)
- 注意到侧面 PAC 是边长为 2 的正三角形, 取 AC 的中点记为 D , 连接 PD , 则 $PD = \sqrt{3}$,
 从而 $PD \perp$ 平面 ABC (8分)
 取 AB 的中点记为 M , 连接 DM , 则 $DM \perp AC$.
 于是, 以 D 为坐标原点, DA, DM, DP 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立空间直角坐标系,



则 $A(1,0,0), P(0,0,\sqrt{3}), C(-1,0,0), B(-1,4,0), E(-\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}), F(-\frac{1}{2},2,\frac{\sqrt{3}}{2})$, 设 $Q(1,y_1,0)$.

于是, $\vec{PQ}=(1,y_1,-\sqrt{3}), \vec{AE}=(-\frac{3}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}), \vec{EF}=(0,2,0)$. 设平面 AEF 的法向量为 $\mathbf{n}=(x_2,y_2,z_2)$, 则

$$\begin{cases} \vec{AE} \cdot \mathbf{n} = 0, \\ \vec{EF} \cdot \mathbf{n} = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} -\frac{3}{2}x_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}z_2 = 0, \\ 2y_2 = 0, \end{cases} \text{ 取 } z_2 = 1, \text{ 则 } x_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}, y_2 = 0, \text{ 即 } \mathbf{n} = (\frac{\sqrt{3}}{3}, 0, 1).$$

又直线 PQ 与平面 AEF 所成角为 α , 于是 $\sin \alpha = |\cos \langle \vec{PQ}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3}|}{\sqrt{1 + \frac{1}{3} \sqrt{4 + y_1^2}}} = \frac{1}{\sqrt{4 + y_1^2}}$,

..... (9分)

而异面直线 PQ, EF 所成角为 β , 于是 $\cos \beta = |\cos \langle \vec{PQ}, \vec{EF} \rangle| = \frac{|y_1|}{\sqrt{4 + y_1^2}}$,

假设存在点 Q 满足题设 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin \alpha = \cos \beta$, 整理得 $|y_1| = 1$

所以, 这样的点 Q 存在, 且有 $AQ = 1$

[命题意图] 本题考查立体几何中的面与面的交线、线面平行、线面垂直、线面角与异面直线所成角的计算, 考查学生的逻辑推理能力和数学表达能力.

20. 解: (1) 由题意可得, 随机变量 X 的所有可能取值为 $0, 1, 2, 3$

$X=0$ 表示从甲、乙两盒中取出的都是白球, 故 $P(X=0) = \frac{C_3^0 \cdot C_4^0}{C_5^0 \cdot C_5^0} = \frac{9}{50}$;

$X=1$ 表示甲盒中取出 1 个白球 1 个红球、乙盒中取出 2 个白球或甲盒中取出 2 个白球、乙盒中取出 1 个白球 1 个红球, 故 $P(X=1) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_5^2} + \frac{C_3^2}{C_5^2} \cdot \frac{C_4^1 C_1^1}{C_5^2} = \frac{12}{25}$;

$X=3$ 表示从甲盒中取出 2 个红球、乙盒中取出 1 个白球 1 个红球, 故 $P(X=3) = \frac{C_2^2}{C_5^2} \cdot \frac{C_4^1 C_1^1}{C_5^2} = \frac{1}{25}$

于是, $P(X=2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=3) = \frac{3}{10}$

所以, 随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{9}{50}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{25}$

数学期望为 $E(X) = 0 \times \frac{9}{50} + 1 \times \frac{12}{25} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{25} = \frac{6}{5}$

(2) 设事件 A_1 : 从甲盒中取出两个红球, 事件 A_2 : 从甲盒中取出两个白球, 事件 A_3 : 从甲盒中取出一个红球一个白球, 事件 B : 从乙盒中取出两个白球.

则 A_1, A_2, A_3 两两互斥, 且 $B = A_1B \cup A_2B \cup A_3B$ (7分)

且 $P(A_1) = \frac{C_2^2}{C_5^2}, P(B|A_1) = \frac{C_4^2}{C_7^2}, P(A_2) = \frac{C_3^2}{C_5^2}, P(B|A_2) = \frac{C_6^2}{C_7^2}, P(A_3) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2}, P(B|A_3) = \frac{C_5^2}{C_7^2}$

..... (10分)

于是, $P(B) = P(A_1B \cup A_2B \cup A_3B) = P(A_1B) + P(A_2B) + P(A_3B)$

$= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$

$$= \frac{C_2^2}{C_5^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_7^2} + \frac{C_3^2}{C_5^2} \cdot \frac{C_6^2}{C_7^2} + \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} \cdot \frac{C_5^2}{C_7^2} = \frac{37}{70}$$

所以, 从甲盒中任取两个球放入乙盒后, 从乙盒中取出两个白球的概率为 $\frac{37}{70}$ (12分)

[命题意图] 本题考查概率与统计的综合应用, 考查随机变量的分布列和期望的计算以及复杂事件的全概率公式, 考查学生的逻辑推理和数学运算素养.

21. 解: (1) 由题意可得 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$, 即 $b^2 = 3a^2$ (1分)

又 $c=2$, 即 $a^2 + b^2 = 4$, 所以, $a^2 = 1, b^2 = 3$ (2分)

因此, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ (3分)

(2) 设点 $M(x, y), P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), x_1, x_2 > 1$, 设直线 l 的方程为 $x = my + 2$,

与双曲线 C 的方程 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 联立, 整理得 $(3m^2 - 1)y^2 + 12my + 9 = 0$,

则 $3m^2 - 1 \neq 0, \Delta = (12m)^2 - 36(3m^2 - 1) = 36(m^2 + 1) > 0$, 整理得 $m^2 \neq \frac{1}{3}$ (5分)

由根与系数的关系得 $y_1 + y_2 = -\frac{12m}{3m^2 - 1}$, 于是 $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 4 = \frac{-4}{3m^2 - 1}$,

注意到 $x_1 + x_2 > 2$, 于是 $\frac{-4}{3m^2 - 1} > 2$, 解得 $m^2 < \frac{1}{3}$ (7分)

又点 M 满足 $\overrightarrow{FP} = \overrightarrow{QM}$, 即 $\begin{cases} x_1 - 2 = x - x_2, \\ y_1 = y - y_2, \end{cases}$ 整理得 $\begin{cases} x = x_1 + x_2 - 2, \\ y = y_1 + y_2, \end{cases}$ (9分)

于是 $\begin{cases} x = \frac{-4}{3m^2 - 1} - 2 = \frac{-6m^2 - 2}{3m^2 - 1}, \\ y = \frac{-12m}{3m^2 - 1}, \end{cases}$ 消去 m 得 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1 (x > 0)$ (10分)

因此, 点 M 的轨迹是以 $(-4, 0), (4, 0)$ 为焦点, 实轴长为 4 的双曲线的右支, (11分)

由双曲线的定义可知, 存在两个定点 $E_1(-4, 0), E_2(4, 0)$, 使得 $|ME_1| - |ME_2| = 4$ (12分)

[命题意图] 本题考查双曲线的定义、几何性质、直线与双曲线的位置关系以及动点轨迹, 考查学生的逻辑推理、数学抽象和数学运算素养.

22. 解: (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

由题意, $f'(x) = -2x + 1 - \frac{a}{x} = \frac{2x^2 - x + a}{x}$ (1分)

若函数 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的单调函数, 则 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒非正或恒非负. (2分)

又 $u = 2x^2 - x + a$ 为开口向上的抛物线, 从而知 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒非正, (3分)

即 $u = 2x^2 - x + a \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 于是, $\Delta = 1 - 8a \leq 0$, 解得, $a \geq \frac{1}{8}$ (4分)

所以, 函数 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的单调递减函数时, 实数 a 的取值范围是 $[\frac{1}{8}, +\infty)$ (5分)

(2) 若函数 $f(x)$ 的极值点为 $x_1, x_2 (x_1 \neq x_2)$, 则 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - x + a = 0$ 的两个不等正实根,

$$\text{从而, } \begin{cases} \Delta = 1 - 8a > 0, \\ x_1 + x_2 = \frac{1}{2} > 0, \\ x_1 x_2 = \frac{a}{2} > 0, \end{cases} \text{ 解得 } 0 < a < \frac{1}{8}.$$

不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 = \frac{1 - \sqrt{1 - 8a}}{4}$, $x_2 = \frac{1 + \sqrt{1 - 8a}}{4}$, 且 $f(x)$ 在 $(0, x_1), (x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 (x_1, x_2) 上单调递增, 从而 x_2 为极大值点, x_1 为极小值点. (7分)

因此, $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_2) - f(x_1) = -x_2^2 + x_2 - a \ln x_2 + x_1^2 - x_1 + a \ln x_1 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) + (x_2 - x_1) + a \ln \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_1 - x_2}{2} + (x_2 - x_1) + a \ln \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{2} + a \ln \frac{x_1}{x_2}$.

所以, 原不等式等价于 $\frac{x_2 - x_1}{2} + a \ln \frac{x_1}{x_2} < \frac{1}{4} - 2a$, (9分)

整理得 $\frac{\sqrt{1 - 8a}}{4} + a \ln \frac{1 - \sqrt{1 - 8a}}{1 + \sqrt{1 - 8a}} < \frac{1}{4} - 2a$, (*) 其中 $0 < a < \frac{1}{8}$.

设 $\sqrt{1 - 8a} = t$, 则 $t \in (0, 1)$, 且 $a = \frac{1 - t^2}{8}$,

则不等式 (*) 等价于 $\frac{t}{4} + \frac{1 - t^2}{8} \ln \frac{1 - t}{1 + t} < \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1 - t^2}{8}$, 其中 $t \in (0, 1)$,

整理得 $\ln \frac{1 - t}{1 + t} < \frac{-2t}{1 + t}$, 其中 $t \in (0, 1)$,

即 $\ln \left(1 + \frac{-2t}{1 + t} \right) < \frac{-2t}{1 + t}$, 其中 $t \in (0, 1)$, (10分)

设 $y = \ln(1 + x) - x$, 由 $y' = \frac{1}{1 + x} - 1 = \frac{-x}{1 + x} > 0$, 得 $x \in (-1, 0)$,

即函数 $y = \ln(1 + x) - x$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

于是, 当 $x = 0$ 时, y 取得最大值 0, 从而, $\ln(1 + x) \leq x$, 当且仅当 $x = 0$ 时取等号.

而 $t \in (0, 1)$, $\frac{-2t}{1 + t} \neq 0$, 所以 $\ln \left(1 + \frac{-2t}{1 + t} \right) < \frac{-2t}{1 + t}$, 其中 $t \in (0, 1)$.

所以, 原不等式成立, 即 $|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{x_1 + x_2}{2} - 2a$ (12分)

[命题意图] 本题考查函数与导数的综合应用, 考查利用导数研究函数的单调性, 证明函数极值满足的含参不等式问题, 考查学生的逻辑推理、数学建模和数学运算素养.

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址: www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。

