

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数学风向卷（二）

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{x|x \leq m\}$, $N = \{x|y = \frac{1}{\sqrt{x^2-3x-4}}\}$. 若 $M \cup N = \mathbf{R}$, 则实数 m 的取值范围是()
 A. $[-1, +\infty)$ B. $[4, +\infty)$ C. $(-\infty, -1]$ D. $(-\infty, 4]$
2. 设 i 为虚数单位，复数 z_0 在复平面内对应的点为 $Z_0(1, 2)$, 且 $z_0 \cdot z = 3 + i$, 则 $|z| =$ ()
 A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
3. 已知 $(a^2 + \frac{2}{a})^n$ 的展开式中最后三项的二项式系数之和为 16, 则展开式中 a^4 的系数为()
 A. 20
 B. 40
 C. 60
 D. 80

4. 某新能源汽车生产公司，为了研究某生产环节中两个变量 x, y 之间的相关关系，统计样本数据得到如下表格：

x_i	20	23	25	27	30
y_i	2	2.4	3	3	4.6

由表格中的数据可以得到 y 与 x 的经验回归方程为 $y = \frac{1}{4}x + a$, 据此计算，下列选项中残差的绝对值最小的样本数据是()

- A. (30, 4.6)
 B. (27, 3)
 C. (25, 3)
 D. (23, 2.4)
5. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，且 a_2 为 $a_1, a_3 + 1$ 的等比中项，则数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为()
 A. 88
 B. 108
 C. 130
 D. 154
6. 已知 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $3\cos 2\alpha + 11 = 16\cos \alpha$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()
 A. $-\frac{4\sqrt{5}}{9}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{9}$ C. $-\frac{2\sqrt{5}}{9}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{9}$
7. 已知平面向量 a, b, c 满足 $|b| = |c| = b \cdot c = 2$, 且 $(b-a) \perp (a-3b)$, 则 $|a-c|$ 的最大值为()
 A. $-\sqrt{3} + 4$
 B. $\sqrt{3} + 4$
 C. $2\sqrt{3} - 2$

D. $2\sqrt{3}+2$

8. 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 经过点 F_2 的直线 l 与 C 的左、右两支分别交于 A, B 两点, D 为线段 AB 的中点, 且 $F_1D \perp l$, $4|F_2B| = |AB|$, 则双曲线 C 的离心率为()

- A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{14}}{2}$ D. 2

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分。

9. 下列不等式成立的是()

- A. $\log_2(\sin 1) > 2^{\sin 1}$
B. $(\frac{1}{\pi})^2 < \pi^{\frac{1}{2}}$
C. $\sqrt{7} - \sqrt{5} < \sqrt{6} - 2$
D. $\log_4 3 < \log_6 5$

10. 记 T 为函数 $f(x) = \cos(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b (\omega > 0)$ 的最小正周期, 且 $T \in (2, 3)$, 函数在 $x = \frac{3\pi}{2}$ 处取得最大值 3, 则()

- A. $b = 3$
B. $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{4\pi}{5}$
C. $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{5}]$ 上单调递减
D. 将函数 $f(x)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 再向下平移 2 个单位长度后与函数 $y = -\sin \frac{5}{2}x$ 的图像重合

11. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x \cos \theta - 2y \sin \theta - 3 = 0, \theta \in \mathbf{R}$, 则()

- A. 圆 C 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相内切

B. 直线 $x \cos \alpha + y \sin \alpha - 3 = 0 (\alpha \in \mathbf{R})$ 与圆 C 相离

C. 圆 C 上到直线 $x + y = 0$ 的距离等于 2 的点只有两个

D. 过直线 $x + y = 4\sqrt{2}$ 上任一点 M 作圆 C 的切线, 切点分别为 E, F , 则四边形 $MECF$ 面积的最小值为 $2\sqrt{5}$

12. 已知球 O 的表面积为 36π , 正四棱锥 $S-ABCD$ 的顶点均在球 O 的表面上, 设 $AB = a$, 则()

- A. 当 $a = 3\sqrt{2}$ 时, 正四棱锥 $S-ABCD$ 的侧面积为 $18\sqrt{3}$
B. 当 $a = 3\sqrt{2}$ 时, 正四棱锥 $S-ABCD$ 的侧面与底面所成角的正切值为 $2\sqrt{2}$
C. 当 $a \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ 时, 正四棱锥 $S-ABCD$ 的体积的最小值为 $2 - \frac{4\sqrt{2}}{3}$
D. 当 $a \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ 时, 正四棱锥 $S-ABCD$ 的体积的最大值为 18

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $P(X \geq 5) = P(X \leq -1) = 0.2$, 则 $P(-1 < X < 2) =$ _____.

14. 已知曲线 $y = f(x) = (x - a)e^x$ 在 $x = -1$ 处的切线与直线 $y = -2x + 1$ 垂直, 则实数 $a =$ _____.

15. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 为棱 B_1C_1 的中点, N 为底面 $ABCD$ 上一动点, 且直线 MN 与底面 $ABCD$ 所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 则动点 N 的轨迹的长度为 _____.

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 且 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x \in [0, 1) \\ \log_2(3 - x), & x \in [1, 2) \\ 2f(x - 2), & x \in [2, +\infty) \end{cases}$, 函数 $g(x) = f(x) - 2^{\frac{x-1}{2}}$ 在区间 $[0, a]$ 内的所有零点为 $x_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$. 若 $\sum_{i=1}^n x_i = 16$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 已知等差数列 $\{a_n\}$, $3a_2 = a_4 + 2$, $a_2 a_3 = a_8$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $a_{n+1} - a_n > 0$, 且数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_1 = a_1$, $b_{n+1} = \begin{cases} a_n, n \text{ 为奇数,} \\ 2^n - b_n, n \text{ 为偶数,} \end{cases}$ 求数列 $\{b_n\}$ 的前 14 项的和.

自主选拔在线
电话: 4000-212250

自主选拔在线
电话: 4000-212250

18. (12分) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 且 $B = 2C$, $C \neq A$.

(1) 证明: $b^2 - c^2 = ac$;

(2) 若 AC 边上的中线 $BD = \sqrt{2}a$, 求 $\tan \angle ABC$.

自主选拔在线
电话: 4000-212250

自主选拔在线
电话: 4000-212250

19. (12分)“坚持‘五育’并举，全面发展素质教育，强化体育锻炼”是我们现阶段教育必须坚持的. 某高中学校鼓励学生自发组织各项体育比赛活动，甲、乙两名同学利用课余时间进行乒乓球比赛，规定：每一局比赛中获胜方记1分，失败方记0分，没有平局，首先获得5分者获胜，比赛结束. 假设每局比赛甲获胜的概率都是 $\frac{3}{5}$.


(1)求比赛结束时恰好打了6局的概率；

(2)若甲以3:1的比分领先时，记 X 表示到比赛结束时还需要比赛的局数，求 X 的分布列及数学期望.

20. (12分)已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面为正三角形， A_1 在底面 ABC 上的射影 O 恰好为棱 AC 的中点，且 $A_1O=3$ ，直线 A_1B 与平面 A_1C_1CA 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$.

(1)在棱 AB 上是否存在一点 D ，使得 $BC_1 \parallel$ 平面 A_1CD ？

(2)若 D 为棱 AB 的中点，求平面 A_1C_1B 与平面 A_1CD 的夹角的余弦值.



21. (12分) 已知 O 为坐标原点, 椭圆 $C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的短轴长为 6, 且经过点 $(-\sqrt{6}, 2)$, 椭圆的左顶点到抛物线 $\Gamma: y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线的距离为 2, 且抛物线的准线和椭圆相交.

(1) 求椭圆 C 和抛物线 Γ 的方程.

(2) 斜率为 $k (k \neq 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 与抛物线 Γ 交于 A, B 两点, 当 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = -4$ 时, 在 x 轴上是否存在定点 T , 使得 $\angle MTN$ 的平分线恰好为 x 轴? 若存在, 求出定点 T 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



22. (12分) 已知函数 $f(x) = \frac{x}{e^x}$, $g(x) = \frac{\ln x}{x}$.

(1) 求证: 函数 $f(x)$ 与函数 $g(x)$ 具有相同的最大值, 并分别指出取得最大值时 x 的值;

(2) 若方程 $f(x) = a$ 和 $g(x) = a$ 共有三个不同的解 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 求证: x_1, x_2, x_3 成等比数列.

