

蚌埠市 2023 届高三年级第三次教学质量检查考试

数学参考答案及评分标准

一、二、选择题:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	C	C	A	D	D	A	D	ABC	BCD	AD	AD

三、填空题

13. $-\frac{1}{6}$

14. -54

15. $\frac{1}{2}$

16. $-2^{1-x}+2(2 \text{ 分}); [\frac{1}{8}, \frac{13}{8}] (3 \text{ 分})$

四、解答题

17. (1) 2×2 列联表如下:

	喜欢足球	不喜欢足球	合计
男生	60	40	100
女生	30	70	100
合计	90	110	200

..... (2 分)

零假设为 H_0 : 该校学生喜欢足球与性别无关联.

根据列联表中的数据, 经计算得到

$$\chi^2 = \frac{200 \times (60 \times 70 - 40 \times 30)^2}{100 \times 100 \times 90 \times 110} \approx 18.182 > 10.828 = \chi_{0.001}$$

根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验, 推断 H_0 不成立, 即认为该校学生喜欢足球与性别有关. (5 分)

(2) 依题意 X 的所有可能取值为 $0, 1, 2, 3$,

$$P(X=0) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{18},$$

$$P(X=1) = C_2^1 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{18},$$

$$P(X=2) = C_2^1 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{4}{9},$$

$$P(X=3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{9}.$$

$\therefore X$ 的分布列如下:

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{18}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$

..... (8 分)

$$\therefore X \text{ 的数学期望 } E(X) = 0 \times \frac{1}{18} + 1 \times \frac{5}{18} + 2 \times \frac{4}{9} + 3 \times \frac{2}{9} = \frac{11}{6}.$$

18. (1) 因为 $f(x) = \sqrt{3} \sin \omega x \cos \omega x + \cos^2 \omega x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2\omega x + \frac{1}{2} \cos 2\omega x = \sin\left(2\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$,
 (3分)

所以函数 $f(x)$ 的最小正周期 $T = \frac{2\pi}{2\omega} = \pi$ (5分)

(2) 由 $2\omega x + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{6}\right)$,

因为函数 $f(x)$ 图象在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内有且仅有一条对称轴,

所以 $\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2}$, 即 $\frac{2}{3} < \omega \leq \frac{8}{3}$, (9分)

所以 $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{4}\omega + \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}$,

所以 $f\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\omega + \frac{\pi}{6}\right) \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 12分

19. (1) 由题意 $a_{2n+1} = a_{2n} + 1 = 2a_{2n-1} + 1$,

所以 $a_{2n+1} + 1 = 2(a_{2n-1} + 1)$,

因为 $a_1 + 1 = 2 \neq 0$, 所以数列 $\{a_{2n-1} + 1\}$ 是首项为 2, 公比为 2 的等比数列, ... (2分)

所以 $a_{2n-1} + 1 = 2^n$, 即 $a_{2n-1} = 2^n - 1$,

而 $a_{2n} = 2a_{2n-1} = 2^{n+1} - 2$, (4分)

所以 $a_n = \begin{cases} 2^{\frac{n+1}{2}} - 1, & n \text{ 为奇数,} \\ 2^{\frac{n}{2}+1} - 2, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$ (6分)

(2) 方法一:

由(1) $T_{2n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_{2i-1}} + \frac{1}{a_{2i}}\right) = \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i - 1} = \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n \frac{2^{i+1} - 1}{(2^i - 1)(2^{i+1} - 1)}$ (8分)

$< \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n \frac{2^{i+1}}{(2^i - 1)(2^{i+1} - 1)} = 3 \sum_{i=1}^n \frac{2^i}{(2^i - 1)(2^{i+1} - 1)}$ (10分)

$= 3 \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2^i - 1} - \frac{1}{2^{i+1} - 1}\right) = 3\left(1 - \frac{1}{2^{n+1} - 1}\right) < 3$ (12分)

方法二:

$\because 2^n - 1 \geq 2^{n-1} (n \in \mathbb{N}^*)$, 8分

$\therefore T_{2n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_{2i-1}} + \frac{1}{a_{2i}}\right) = \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i - 1} \leq \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^{i-1}} = 3\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < 3$ (12分)

20. (1) 解: 延长 CG 交 AB 于点 H , 连接 CH, DH ,

因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 所以 H 为 AB 的中点, 且 $\frac{CG}{CH} = \frac{2}{3}$, (2分)

因为平面 $ABD \parallel$ 平面 EFG , 平面 $ABD \cap$ 平面 $DCH = DH$, 平面 $EFG \cap$ 平面 $DCH = FG$,


所以 $FG \parallel DH$, (4分)

所以 $\frac{CF}{CD} = \frac{CG}{CH} = \frac{2}{3}$, 所以 $\frac{DF}{CF} = \frac{1}{2}$ (5分)

(2) 解: 因为 $AB \perp$ 平面 BCD , $BC, CD \subset$ 平面 BCD , 所以 $AB \perp BC, AB \perp CD$,

因为 $CD \perp CB, CD \perp AB, BC \cap AB = B, BC, AB \subset$ 平面 ABC , 所以 $CD \perp$ 平面 ABC , (7分)

如图, 以 BA 为 x 轴, BC 为 y 轴, 过 B 与 CD 平行的直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系,



第 20 题答案图

方法一:

由(1)同理可得 $EF \parallel BD$, 则 $\frac{CF}{CD} = \frac{CE}{CB} = \frac{2}{3}$,

所以 $A(3, 0, 0), F(0, 3, 2), E(0, 1, 0), G(1, 1, 0), C(0, 3, 0), D(0, 3, 3)$,

所以 $\vec{GF} = (-1, 2, 2), \vec{GE} = (-1, 0, 0), \vec{CD} = (0, 0, 3), \vec{CA} = (3, -3, 0)$ (8分)

设平面 EFG 的法向量为 $m = (a, b, c)$, 则 $\begin{cases} m \cdot \vec{GF} = -a + 2b + 2c = 0, \\ m \cdot \vec{GE} = -a = 0, \end{cases}$

令 $b = 1$, 则 $a = 0, c = -1$, 则 $m = (0, 1, -1)$,

设平面 ACD 的法向量为 $n = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} n \cdot \vec{CD} = 3z = 0, \\ n \cdot \vec{CA} = 3x - 3y = 0, \end{cases}$

令 $x = 1$, 则 $y = 1, z = 0$, 则 $n = (1, 1, 0)$, (10分)

设平面 EFG 与平面 ACD 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|n \cdot m|}{|n| \cdot |m|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$,

所以平面 EFG 与平面 ACD 的夹角的大小为 $\frac{\pi}{3}$ (12分)

方法二:

易知 $A(3, 0, 0), C(0, 3, 0), D(0, 3, 3)$,

所以 $\vec{CD} = (0, 0, 3), \vec{CA} = (3, -3, 0), \vec{BD} = (0, 3, 3), \vec{BA} = (3, 0, 0)$ (8分)

设平面 ABD 的法向量为 $m = (a, b, c)$, 则 $\begin{cases} m \cdot \vec{BD} = 3b + 3c = 0, \\ m \cdot \vec{BA} = 3a = 0, \end{cases}$

令 $b = 1$, 则 $a = 0, c = -1$, 则 $m = (0, 1, -1)$,

因为平面 $ABD \parallel$ 平面 EFG , 所以平面 EFG 的法向量即 $m = (0, 1, -1)$,

(下同方法一)

21. (1) 设 $M(x_M, y_M)$, 由题意 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 且 $\frac{x_M^2}{4} - y_M^2 = 1$,

所以 $k_1 \cdot k_2 = \frac{y_M}{x_M + 2} \cdot \frac{y_M}{x_M - 2} = \frac{y_M^2}{x_M^2 - 4} = \frac{\frac{x_M^2}{4} - 1}{x_M^2 - 4} = \frac{1}{4}$ (4分)

(2) 设 $M(x_M, y_M), N(x_N, y_N), P(1, t)$, BN 的斜率为 k_3 , 由 $\vec{QS} = 2\vec{SP}$ 知: ζ

所以 $\frac{k_1}{k_3} = \frac{k_{AP}}{k_{BQ}} = \frac{\frac{t}{1-(-2)}}{-2t} = \frac{1}{6}$.

由(1)知: $k_1 \cdot k_2 = \frac{1}{4}$, 所以 $k_2 \cdot k_3 = \frac{3}{2}$ (6分)

设 $MN: x = my + n (m \neq 0, m \neq \pm 2, n \neq 2)$ ①

双曲线 $E: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ②

联立①②得: $(m^2 - 4)y^2 + 2mny + n^2 - 4 = 0$,

所以 $y_M + y_N = -\frac{2mn}{m^2 - 4}, y_M y_N = \frac{n^2 - 4}{m^2 - 4}$, (9分)

所以 $k_2 \cdot k_3 = \frac{y_M}{x_M - 2} \cdot \frac{y_N}{x_N - 2} = \frac{y_M y_N}{(my_M + n - 2)(my_N + n - 2)} = \frac{3}{2}$,

即 $(3m^2 - 2)y_M y_N + 3m(n - 2)(y_M + y_N) + 3(n - 2)^2 = 0$,

整理得 $n = \frac{10}{7}$,

故直线 MN 过定点 $(\frac{10}{7}, 0)$ (12分)

22. (1) 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F'(x) = e^x - 1 > 0 \Rightarrow x > 0$,

所以 $F(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $F(x) \geq F(0) = 0$,

所以 $f(x) = e^x - 1 \geq x$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立, (2分)

所以 $f(\ln(x+1)) = x \geq \ln(x+1)$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立,

即 $f(x) \geq x \geq g(x)$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立. (4分)

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线为 l , 直线 l 与 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别切于点 $A(x_1, e^{x_1} - 1)$ 和点 $B(x_2, \ln(x_2 + a))$

易知 $f'(x) = e^x, g'(x) = \frac{1}{x+a}$,

方法一:

由题意知, 公切线 $l: y = e^{x_1}(x - x_1) + e^{x_1} - 1, y = \frac{1}{x_2 + a}(x - x_2) + \ln(x_2 + a)$,

所以 $\begin{cases} e^{x_1} = \frac{1}{x_2 + a}, \\ (1 - x_1)e^{x_1} - 1 = \ln(x_2 + a) - \frac{x_2}{x_2 + a}. \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 = -\ln(x_2 + a), \\ (1 - x_1)e^{x_1} = \ln(x_2 + a) + \frac{a}{x_2 + a}. \end{cases}$

所以 $\frac{1 + \ln(x_2 + a)}{x_2 + a} = \ln(x_2 + a) + \frac{a}{x_2 + a}$, 即 $(x_2 + a - 1)\ln(x_2 + a) + a - 1 = 0$.

..... (6分)

令 $G(u) = (u - 1)\ln u + a - 1$, 则 $G(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在两个零点.

因为 $G'(u) = \ln u + \frac{u-1}{u}, G''(u) = \frac{1}{u} + \frac{1}{u^2} > 0$,

所以 $G'(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

又因为 $G'(1) = 0$, 所以 $G(u)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单

1° 若 $a > 1$, 则 $G(u) \geq G(1) = a - 1 > 0$,

所以 $G(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 上没有零点. (7分)

2°若 $a=1$, 则 $G(u) \geq G(1) = 0$, 当且仅当 $u=1$ 时, 等号成立,

所以 $G(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且只有一个零点. (8分)

3°若 $a < 1$, 令 $u_0 = e^{2a-3}$, 则 $0 < u_0 < \frac{1}{e} < \frac{1}{2}$, 且 $\ln u_0 < 0$,

$$\text{所以 } G(u_0) = (u_0 - 1)\ln u_0 + a - 1 > -\frac{1}{2}\ln u_0 + a - 1 = -\frac{(2a-3)}{2} + a - 1 = \frac{1}{2} > 0,$$

..... (10分)

$$G(1) = a - 1 < 0,$$

$$G(e^{1-a} + 1) = e^{1-a}\ln(e^{1-a} + 1) + a - 1 > \ln(e^{1-a} + 1) + a - 1 > \ln e^{1-a} + a - 1 = 0,$$

所以 $G(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在两个零点,

综上所述, $a < 1$ (12分)

方法二:

$$\text{由题意知 } k_{AB} = f'(x_1) = g'(x_2), \text{ 即 } \frac{e^{x_1} - 1 - \ln(x_2 + a)}{x_1 - x_2} = e^{x_1} = \frac{1}{x_2 + a},$$

$$\text{整理得: } 1 - x_1 + \frac{x_1}{e^{x_1}} - a = 0, \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

令 $H(x) = 1 - x + \frac{x}{e^x} - a, x \in \mathbb{R}$, 依题意 $H(x)$ 在 \mathbb{R} 上存在两个零点.

$$\text{易知 } H'(x) = -1 + \frac{1-x}{e^x} = \frac{1-x-e^x}{e^x},$$

令 $u(x) = 1 - x - e^x$, 则 $u'(x) = -1 - e^x < 0$, 可知 $u(x)$ 是减函数, 且 $u(0) = 0$,

所以当 $x < 0, u(x) > 0, H'(x) > 0, H(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 单调递增;

当 $x > 0, u(x) < 0, H'(x) < 0, H(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递减.

由题意知, $H(0) = 1 - a > 0$, 解得 $a < 1$, 8分

令 $x_0 = 1 + \frac{1}{e} - a > 0$, 又易证 $e^x \geq ex$, 当且仅当 $x=1$ 时, 等号成立.

$$\text{则 } H(x_0) = 1 - x_0 + \frac{x_0}{e^{x_0}} - a \leq 1 - x_0 + \frac{x_0}{ex_0} - a = 1 - x_0 + \frac{1}{e} - a = 1 - \left(1 + \frac{1}{e} - a\right) + \frac{1}{e} - a = 0,$$

因为 $H(0)H(x_0) \leq 0, H(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递减, 所以 $H(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点,

$$\text{令 } x' = a - 2 < -1, \text{ 所以 } \frac{1}{e^{x'}} > 2,$$

$$\text{则 } H(x') = 1 - x' + \frac{x'}{e^{x'}} - a < 1 - x' + 2x' - a = 1 + x' - a = -1 < 0,$$

因为 $H(0)H(x') < 0, H(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 单调递增,

所以 $H(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上存在唯一零点,

综上所述, $a < 1$ (12分)

(以上答案仅供参考, 其它解法请参考以上评分标准酌情赋分)