

2024 届高三一轮复习联考(一)

化学参考答案及评分意见

- 1.D 【解析】浓盐酸具有还原性，在实验室常用它与 MnO₂ 混合加热制取氯气，A 正确；硫酸铜粉末是白色的，吸水后生成蓝色的胆矾，通过颜色是否变为蓝色，检验是否含有水，B 正确；碳酸氢钠受热容易分解产生 CO₂ 使食品膨松，可作食品膨松剂，C 正确；铁与氯气反应需要加热或者点燃，但常温下不反应，所以能用铁质容器运输液氯，D 错误。
- 2.A 【解析】当有 4 mol 气体(1 mol N₂ 和 3 mol CO₂)生成时，转移电子数为 12N_A，标准状况下，当有 8.96 L 气体即 0.4 mol 气体生成时，则转移电子数为 1.2N_A，A 正确；因 S²⁻ 水解使溶液中 S²⁻ 的数目小于 0.1N_A，B 错误；反应中 S、N 的化合价均降低，所以 S 和 KNO₃ 均为氧化剂，C 错误；N₂ 为单质，既不是电解质也不是非电解质，D 错误。
- 3.B 【解析】尿糖是指尿中的葡萄糖，可以与新制氢氧化铜悬浊液反应，产生砖红色沉淀，是化学变化，A 错误；燃放烟花时放出五彩斑斓的火花，呈现的是金属元素的焰色，发生的是物理变化，B 正确；胃酸与氢氧化铝发生酸碱中和反应，涉及化学变化，C 错误；纯碱溶液清洗油污，利用碳酸钠水解呈碱性，使油脂水解而除去，涉及化学变化，D 错误。
- 4.A 【解析】铁的冶炼使用热还原法，高炉炼铁原理：Fe₂O₃+3CO $\xrightarrow{\text{高温}}$ 2Fe+3CO₂，A 正确；过氧化钠做呼吸面具的供氧剂，即过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气，化学方程式为 2Na₂O₂+2CO₂=2Na₂CO₃+O₂，B 错误；工业冶炼 Mg 用电解熔融的 MgCl₂ 而不用 MgO，因为 MgO 的熔点高，耗能大，C 错误；侯氏制碱法首先发生化学反应：NaCl+CO₂+NH₃+H₂O=NaHCO₃↓+NH₄Cl，然后再加热 NaHCO₃ 得纯碱 Na₂CO₃，D 错误。
- 5.A 【解析】可用容量瓶配制一定浓度的溶液，题图操作符合要求，能达到实验目的，A 正确；先打开止水夹 a，发生反应 Fe+H₂SO₄=FeSO₄+H₂↑，用产生的 H₂ 排尽装置中的空气，一段时间后再关闭止水夹 a，继续产生 H₂，A 试管中气体压强增大，因为止水夹 a 关闭，无法将 A 试管中的溶液压入 B 试管中，无法制备少量 Fe(OH)₂，B 错误；Cl₂ 可氧化 Br⁻、I⁻，但图中实验不能保证是 Br₂ 氧化 I⁻，无法证明氧化性 Br₂>I₂，C 错误；外管的温度高，内管的温度低于外管的，无法验证 NaHCO₃ 和 Na₂CO₃ 的热稳定性，D 错误。
- 6.C 【解析】NaHCO₃ 在水中的电离方程式为 NaHCO₃=Na⁺+HCO₃⁻，A 错误；B 点处加入 NaHCO₃ 的物质的量与 Ba(OH)₂ 的物质的量相等，发生的反应为 Ba²⁺+OH⁻+HCO₃⁻=BaCO₃↓+H₂O，溶液中的 CO₃²⁻ 完全沉淀，其浓度不会增大，B 错误；B→C 过程中加入的 NaHCO₃ 继续消耗氢氧根离子，C 点两者恰好完全反应，发生反应 OH⁻+HCO₃⁻=H₂O+CO₃²⁻，C 正确；根据反应 OH⁻+HCO₃⁻=H₂O+CO₃²⁻，B 点的 OH⁻ 与 C 点的 CO₃²⁻ 的物质的量相等，但 B 点和 C 点溶液的体积不同，所以阴离子浓度不同，D 错误。
- 7.B 【解析】灼烧用到的仪器为酒精灯、坩埚、泥三角、三脚架、玻璃棒等；过滤需要烧杯、玻璃棒、漏斗；萃取分液及反萃取需要分液漏斗和烧杯；坩埚、泥三角、三脚架都不是玻璃仪器，故用到的玻璃仪器有①②④⑥⑦。
- 8.A 【解析】浓硫酸与 Na₂SO₃ 发生复分解反应，即 H₂SO₄(浓)+Na₂SO₃=SO₂↑+Na₂SO₄+H₂O，A 错误；停止实验时，打开 K，可使空气进入反应装置中，维持压强平衡，可防止倒吸，B 正确；SO₂ 在与 Mg 反应时，未反应的 SO₂ 进入④中，SO₂ 能使品红溶液褪色，加热褪色后的溶液又可恢复红色，C 正确；
- $$\text{SO}_2+2\text{Mg} \xrightarrow{\Delta} \text{S}+2\text{MgO}, \text{Mg}+\text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{MgS}$$
- MgS 与盐酸反应产生臭鸡蛋气味的 H₂S，D 正确。

一轮复习联考(一) 化学答案 第 1 页(共 5 页)

9.B 【解析】将氢氧化铁灼烧得 Fe_2O_3 , 铁元素的质量为 $(W_2 - W_1)\text{g} \times \frac{56 \times 2}{160} = 0.7(W_2 - W_1)\text{g}$,

样品中铁元素的质量分数为 $\frac{0.7(W_2 - W_1)\text{g}}{\frac{1}{10}m\text{ g}} \times 100\% = \frac{700(W_2 - W_1)}{m}\%$, B 正确。

10.C 【解析】配制 100 mL 一定物质的量浓度的稀盐酸, 需要用到 100 mL 容量瓶, A 错误; 加试剂除去杂质, 过滤后需蒸发分离出 NaCl, 缺少玻璃仪器酒精灯、蒸发皿, 不能完成实验, B 错误; 用稀盐酸溶解药片后, 滴加 KSCN 溶液, 若溶液变为红色, 说明药片已变质, 给出的试剂及仪器可完成实验, C 正确; 制备 Fe(OH)_3 胶体需要饱和 FeCl_3 溶液和蒸馏水, 不能用 NaOH 溶液, D 错误。

11.D 【解析】酸浸时的主要目的是将 MnO_2 还原为 Mn^{2+} , 因此反应的离子方程式为

$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Fe}^{2+} = 2\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$, A 正确; 试剂 A 的目的是将过量 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , 利于后续除杂, B 正确; 酸浸时, Fe_2O_3 、 Al_2O_3 分别转化为 Fe^{3+} 、 Al^{3+} , SiO_2 不反应, 因此滤渣 1 为 SiO_2 ; 为除杂而不引入杂质, 可加入 MnO 或 MnCO_3 调节溶液 pH, 使 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 分别转化为 Fe(OH)_3 、 Al(OH)_3 沉淀, 因此滤渣 2 为 Fe(OH)_3 、 Al(OH)_3 , C 正确, D 错误。

12.B 【解析】由图中转化可知反应 I、II 均为 Fe^{2+} 与 O_2 反应生成 Fe^{3+} , 且体系中开始加入了硫酸, 因此离子方程式为 $4\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$, A 正确; 温度过高, 微生物的活性降低或失去活性, 使浸出率降低, B 错误; 由图可知: $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 和 H_2SO_4 可循环利用, C 正确; 铁元素最终转化为 Fe^{3+} , 硫元素转化为 SO_4^{2-} , 当有 2 mol SO_4^{2-} 生成时, 失去电子共 17 mol, 消耗 O_2 的物质的量为 $\frac{17}{4}\text{ mol} = 4.25\text{ mol}$, D 正确。

13.A 【解析】I 是空白实验, 排除因体积变化对 II、III 溶液 pH 的影响, A 正确; II 和 I 的 pH 曲线基本重合, 说明 CO_3^{2-} 与 OH^- 不反应, II 中发生反应: $\text{CO}_3^{2-} + \text{Ca}^{2+} = \text{CaCO}_3 \downarrow$, B 错误; III 中石灰水恰好完全反应时, 发生反应: $2\text{HCO}_3^- + 2\text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_3^{2-}$, 溶质为碳酸钠, 其溶液显碱性, $\text{pH} > 7$, C 错误; 若将试剂 X 换为 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, 发生反应: $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$, 恰好完全反应时生成碳酸钙沉淀和水, $\text{pH} = 7$, 不会与 III 的 pH 曲线重合, D 错误。

14.D 【解析】过氧化钙的性质与过氧化钠类似, 与水反应的化学方程式为 $2\text{CaO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 \uparrow$, A 正确; 在 140 ℃ 时恰好完全脱水, 杂质受热不分解, 则样品中 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 含有的结晶水的总质量为 $2.76\text{ g} - 1.32\text{ g} = 1.44\text{ g}$, $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{1.44\text{ g}}{18\text{ g/mol}} = 0.08\text{ mol}$, 原样品中含 $n(\text{CaO}_2) = \frac{0.08\text{ mol}}{8} = 0.01\text{ mol}$, $m(\text{CaO}_2) = 72\text{ g/mol} \times 0.01\text{ mol} = 0.72\text{ g}$, 样品中 CaO_2 的含量为 $\frac{0.72\text{ g}}{2.76\text{ g}} \times 100\% \approx 26.09\%$, B 正确; 在 60 ℃ 时固体的质量为 1.68 g, 失去结晶水的质量为 $m(\text{H}_2\text{O})_{\text{失}} = 2.76\text{ g} - 1.68\text{ g} = 1.08\text{ g}$, 失去结晶水的物质的量为 $n(\text{H}_2\text{O})_{\text{失}} = \frac{1.08\text{ g}}{18\text{ g/mol}} = 0.06\text{ mol}$, 故在 60 ℃ 时 $\text{CaO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 中 $x = \frac{0.08\text{ mol} - 0.06\text{ mol}}{0.01\text{ mol}} = 2$, C 正确; 在 140 ℃ 时, $m(\text{CaO}_2) = 72\text{ g/mol} \times 0.01\text{ mol} = 0.72\text{ g}$, $m(\text{杂质}) = 1.32\text{ g} - 0.72\text{ g} = 0.60\text{ g}$, 所以在 350 ℃ 时, 剩余固体(杂质除外)的质量为 $1.16\text{ g} - 0.60\text{ g} = 0.56\text{ g}$, 由钙元素质量守恒知钙元素的物质的量为 0.01 mol, 剩余固体(杂质除外)的摩尔质量为 $0.56\text{ g} \div 0.01\text{ mol} = 56\text{ g/mol}$, 则剩余固体为 CaO , D 错误。

15.B 【解析】加入过量 NaOH 溶液,加热,得到无色气体,该气体为氨气,原溶液中一定存在 NH_4^+ ,A 正确;溶液 C 进行焰色试验,火焰呈黄色,不能说明原溶液含有 Na^+ ,因为加入的 NaOH 溶液引入了 Na^+ ,B 错误;沉淀灼烧得到红棕色固体为三氧化二铁,说明原溶液中含有铁元素,可能为 Fe^{3+} 、 Fe^{2+} ,则原溶液中一定没有 CO_3^{2-} ;滤液中加入足量氯化钡溶液和盐酸,经过滤后得到的 4.66 g 沉淀为硫酸钡沉淀,硫酸钡的物质的量为 $\frac{4.66 \text{ g}}{233 \text{ g/mol}} = 0.02 \text{ mol}$,原溶液中含有 0.02 mol 硫酸根离子,且 $c(\text{SO}_4^{2-}) = \frac{0.02 \text{ mol}}{0.1 \text{ L}} = 0.2 \text{ mol/L}$,则不含 Ba^{2+} 。而溶液一定含有 NH_4^+ ,所含离子的浓度均相等,由溶液呈电中性分析,溶液中一定含有阴离子 Cl^- 、 SO_4^{2-} 和阳离子 Fe^{2+} 、 NH_4^+ ,一定无 CO_3^{2-} 、 Ba^{2+} 、 Fe^{3+} 和 Na^+ ,C 正确,D 正确。


16.(13 分)



(2) 硫酸亚铁被氧化(1 分)

(3) K_2FeO_4 具有强氧化性,可用于杀菌消毒,其还原产物为 Fe^{3+} , Fe^{3+} 可以水解为胶体,以吸附水中的悬浮物而净水(2 分)

(4) AC(2 分)



① 2 滴 FeSO_4 溶液和 1 滴蒸馏水(2 分)

② 2(2 分)


【解析】(1) 甲为 Fe, 高温时与水蒸气反应转化为 Fe_3O_4 , 反应的化学方程式为 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O(g)} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$

(2) 由于 Fe^{2+} 具有还原性, 极易被氧化生成 Fe^{3+} , 所以这层糖衣的作用是防止 FeSO_4 被空气中的氧气氧化;

(3) K_2FeO_4 中 Fe 处于高价态, 具有强氧化性, 可用于杀菌消毒, 其还原产物为 Fe^{3+} , Fe^{3+} 可以水解为胶体, 以吸附水中的悬浮物而净水。

(4) 若无固体剩余, 说明加入的锌粉完全反应, 则溶液中可能含有 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Zn^{2+} 四种离子,A 正确; 若溶液中有 Cu^{2+} , 加入的锌可能只与 Fe^{3+} 反应, 也可能与 Fe^{3+} 反应之后, 剩余部分与 Cu^{2+} 反应生成铜, 所以可能有固体 Cu 析出,B 错误; 若有固体存在, 锌先与铁离子反应生成亚铁离子, 然后锌与铜离子发生反应, 所以一定有反应 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ 发生,C 正确; 当加入的锌粉较少时, 只发生 $\text{Zn} + 2\text{Fe}^{3+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$, 不会有铜析出, 但若加入的金属锌粉较多时, 则会析出金属铜,D 错误;

(5) 丁为氢氧化亚铁, 可与氧气、水反应生成氢氧化铁, 反应的化学方程式为



① 由实验操作可知, 实验 II 验证猜想 2, 实验 I 验证猜想 1, 实验 I 需要使用 Fe^{2+} 过量且需要保证硫酸亚铁溶液的浓度与实验 II 的相同, 根据对比实验的单一变量原则, 则需要向两片玻璃片中心分别滴加 2 滴 FeSO_4 溶液和 1 滴蒸馏水, 然后再滴加 2 滴 NaOH 溶液, 面对面快速夹紧;

② 实验 I、实验 II 变量为是否存在铁离子, 实验 II 现象为玻璃片夹缝中立即有灰绿色浑浊, 实验 I 现象为玻璃片夹缝中有白色浑浊, 分开玻璃片, 白色浑浊迅速变为灰绿色; 说明呈现灰绿色的原因是存在三价铁, 故猜想 2 正确。

17.(14 分)

(1) 氧化性、酸性(1 分)

(3) 防止 Na_2SO_3 被氧化(2 分)


(4) 过滤(1 分) 玻璃棒没有紧靠三层滤纸一边、漏斗下端没有紧贴烧杯内壁(2 分)



(6) 减少(2 分)

【解析】(1) 铜与浓硫酸在加热条件下反应生成还原产物 SO_2 和盐 CuSO_4 , 浓硫酸体现了氧化性、酸性;(2) 反应 II 所得溶液的 pH 为 3~4, 说明所得溶液显酸性, 根据 H_2SO_3 的电离平衡常数 $K_{a_1} = 1.3 \times 10^{-2}$, $K_{a_2} = 6.3 \times 10^{-8}$, 可知产物为 NaHSO_3 , 所以反应的离子方程式为 $2\text{SO}_2 + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + 2\text{HSO}_3^-$ (3) 反应 II 所得产物为 NaHSO_3 , 调节溶液 pH=11, 使 NaHSO_3 转化为 Na_2SO_3 , Na_2SO_3 具有还原性, 易被氧化, 所以低温真空蒸发的目的是防止 Na_2SO_3 被氧化;

(4) “固液分离”的操作是过滤, 过滤操作要注意“一贴二低三靠”, 图示中不规范的地方为玻璃棒没有紧靠三层滤纸一边、漏斗下端没有紧贴烧杯内壁;

(5) 化合物 X 是 Na_2SO_3 , 根据图示的反应物及产物, 则反应的离子方程式为溶液 Y 是 Na_2SO_3 溶液, 可循环用于反应 II 的操作吸收 SO_2 气体, 反应 III 产生的 SO_2 气体可以在反应 II 中使用, 所以可以循环的物质为 Na_2SO_3 溶液和 SO_2 。(6) 化合物 X 是 Na_2SO_3 , 反应 III 的离子方程式为 $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{SO}_4^{2-} + \text{Cu}_2\text{O} \downarrow + 4\text{H}^+$, 反应过程中酸性越来越强, 使 Na_2SO_3 转化成 SO_2 气体。若 Cu_2O 产量不变, 增大 $\frac{n(\text{X})}{n(\text{CuSO}_4)}$, 则过量的 Na_2SO_3 会消耗氢离子, 用于控制 pH, 因此可减少 NaOH 的量。

18.(14 分)

(1) 浓硫酸(1 分) 平衡气压, 观察实验装置是否堵塞(1 分)

(2) 检查装置气密性(1 分) 通入 N_2 (1 分)将 COCl_2 完全排入装置 G 中被充分吸收, 并将生成的 CrCl_3 全部吹入 E 中充分收集(2 分)(3) 用酒精灯对 D 处导管进行加热(2 分) 防止 G 中的水蒸气进入 E 中而导致 CrCl_3 水解(2 分)(4) 防止倒吸, 并吸收尾气 COCl_2 , 防止污染空气(2 分) $\text{COCl}_2 + 4\text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + 2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)【解析】(1) CrCl_3 易潮解, 要防止水蒸气进入, 通入的 N_2 需要干燥, 因此 A 中的试剂为浓硫酸。若后面装置堵塞, 长玻璃导管内的液面上升, 所以长玻璃导管的作用是平衡气压, 观察实验装置是否堵塞。(2) 连接好装置后, 先是检查装置的气密性, 再装入药品; 开始实验时, 先通入 N_2 , 排尽装置中的空气, 再加热管式炉; 因 COCl_2 有毒, 实验结束后, 应再持续通一段时间的 N_2 将装置中的 COCl_2 全部排入 G 中被完全吸收, 并将产物 CrCl_3 全部吹入 E 中充分收集。

(3)实验过程中若 D 处出现堵塞,因 CrCl_3 易升华,应用酒精灯对 D 处导管加热即可; CrCl_3 易潮解,F 中无水 CaCl_2 的作用是防止 G 中的水蒸气进入 E 中而导致 CrCl_3 水解。

(4)因 COCl_2 有毒,实验结束后,要注意尾气吸收和防倒吸,因此 G 装置的作用是防止倒吸,并吸收尾气 COCl_2 ,防止污染空气;根据信息 COCl_2 遇水发生水解,生成两种酸性气体,应为 CO_2 和 HCl ,因此, COCl_2 与 NaOH 溶液反应的离子方程式为 $\text{COCl}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + 2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O}$

19.(14 分)

(1)升温、粉碎、增大硫酸的浓度(答出一条即可,1 分)

(2)10.1(1 分) CaC_2O_4 (2 分)

(3) I (2 分) $1.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分) $60 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

(4)减小 Li_2CO_3 的溶解量,提高产率 (2 分) b(2 分)

(5)1.802(2 分)

【解析】(1)影响速率的因素有温度、浓度、接触表面积等,故提高酸浸速率的措施可以是升温、粉碎、增大硫酸的浓度等。

(2)调 pH 主要除去 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Mn^{2+} 等,使它们以氢氧化物的形式沉淀下来,因此 pH 最小要调到 10.1,而 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶解度较大,不能除去 Ca^{2+} 。后续步骤加入草酸溶液, Ca^{2+} 与草酸分子结合生成 CaC_2O_4 沉淀而被除去,因此“除杂”步骤后,主要杂质离子的沉淀形式为 CaC_2O_4 。

(3)在液体量一定的情况下,固体越多,锂的浸出率越小,因此曲线 I 表示反应固液比对锂的浸出率的影响;从图中可以看出,当固液比超过 $60 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 时,锂的浸出率呈现明显的下降趋势,选择最佳固液比为 $60 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$;硫酸的浓度为 $1.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时,锂的浸出率很高,再增加硫酸的浓度,锂的浸出率提高不大,因此硫酸浓度最佳为 $1.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(4)由图中可知, Li_2CO_3 的溶解度随温度的升高而降低,将温度升高至 90 ℃是为了提高沉淀反应速率和减小 Li_2CO_3 的溶解度,提高产率;得到沉淀时应趁热过滤,故选 b。

(5)取 100 mL“除杂”后的溶液,其中 $c(\text{Li}^+) = 0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,为使锂元素的回收率不低于 70%,则溶液中剩余 Li^+ 浓度为 $30\% \times 0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.06 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

则溶液中 $c(\text{CO}_3^{2-}) = \frac{3.6 \times 10^{-4}}{0.06^2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

需要碳酸钠的物质的量为 $0.1 \text{ mol/L} \times 0.1 \text{ L} = 0.01 \text{ mol}$,

沉淀锂离子需要碳酸钠的物质的量为 $0.1 \text{ L} \times 0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 70\% \times \frac{1}{2} = 0.007 \text{ mol}$,

最少需要碳酸钠的物质的量为 $0.007 \text{ mol} + 0.01 \text{ mol} = 0.017 \text{ mol}$,

其质量为 $0.017 \text{ mol} \times 106 \text{ g/mol} = 1.802 \text{ g}$ 。

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（**网址：**www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线

