


2023 届高三二轮复习联考(三) 全国卷

理科数学参考答案及评分意见

- 1.B 【解析】 $z = \frac{2-i}{1+i} = \frac{(2-i)(1-i)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$, 所以 $z - \bar{z} = -3i$. 故选 B.
- 2.A 【解析】 $A = \{x | -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{y | y > 0\}$, 所以 $A \cap B = (0, 5]$. 故选 A.
- 3.D 【解析】令 $x=1$ 可得展开式中所有项的系数和为 $2^n = 512$, 所以 $n=9$, 故 $T_{r+1} = C_9^r (3x)^{9-r} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r = (-1)^r \cdot 3^{9-r} \cdot C_9^r x^{9-\frac{3}{2}r}$, 令 $9 - \frac{3}{2}r = 0$, 则 $r=6$, 所以展开式中的常数项为: $T_7 = 2\,268$. 故选 D.
- 4.B 【解析】对于 A, 在一个 2×2 列联表中, 由计算得 K^2 的值, K^2 的值越大, 两个变量有关的把握越大, 故 A 错误; 对于 B, $f(x) = P(x \leq \xi \leq x+2)$ 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$, 即 $P(-x \leq \xi \leq -x+2) = P(x \leq \xi \leq x+2)$, 故可得 $\mu = \frac{-x+x+2}{2} = 1$, 故 B 正确; 对于 C, $6 \neq 1.2 \times 4 + 2$, 所以样本点的中心不可能为 $(4, 6)$, C 错误; 对于 D, 具有线性相关关系的两个变量 x, y 的相关系数为 r , 则 $|r|$ 越接近于 1, x 和 y 之间的线性相关程度越大, 故 D 错误. 故选 B.
- 5.C 【解析】易知圆心 $C(2, 2)$ 关于直线 $x+y=0$ 的对称点为 $C'(-2, -2)$, 设反射光线所在的直线斜率为 k , 则反射光线所在的直线方程为 $kx - y + 2k - 2 = 0$, 所以 $\frac{4k-4}{\sqrt{1+k^2}} = 2\sqrt{2}$, 整理得 $k^2 - 4k + 1 = 0$, 解得 $k = 2 + \sqrt{3}$ 或 $k = 2 - \sqrt{3}$. 故选 C.
- 6.C 【解析】由 $\sin(\alpha + \beta) + 2\cos(\alpha - \beta) = 0$ 得 $\frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta} = -2$, 即 $\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = -2$, 由 $\sin \alpha \sin \beta + 2\cos \alpha \cos \beta = 0$ 得 $\tan \alpha \tan \beta = -2$, 所以 $\tan \alpha + \tan \beta = 2$, 故 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{2}{3}$. 故选 C.
- 7.B 【解析】由题 $10^{2a} + b = 2.8$, $10^{4a} + b = 2.64$, 得 $10^{4a} - 10^{2a} + 0.16 = 0$, 解得 $10^{2a} = 0.2$ 或 $10^{2a} = 0.8$, $10^{2a} = 0.2$ 时, $b = 2.6$, 不合题意舍去, 当 $10^{2a} = 0.8$ 时, $b = 2$, 所以 $y = 10^{ax} + 2$, 当 $x=1$ 时, $y = 10^a + 2 = \sqrt{0.8} + 2 = 2 + \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 2.894$, 所以在上市第 1 个月时, 该款电子产品的售价约为 2.894 万元. 故选 B.
- 8.A 【解析】双曲线 C 的两条渐近线方程为 $y = \pm \frac{a}{b}x$, 若 $y_1 y_2 > 0$ 恒成立, 则 A, B 两点始终位于 x 轴同侧, 则 $0 < \angle AOB \leq \frac{\pi}{2}$, 故 $\frac{a}{b} \geq 1$, 即 $a \geq b$, 即 $a^2 \geq c^2 - a^2$, 得 $e = \frac{c}{a} \leq \sqrt{2}$, 所以双曲线离心率的取值范围为 $(1, \sqrt{2}]$. 故选 A.
- 9.B 【解析】由题, 当 $0 \leq a < 1$ 时, 输出的 $b \in \left(\frac{1}{2}, 1\right]$; 当 $1 \leq a < 2$ 时, 输出的 $b \in \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$; 当 $2 \leq a < 4$ 时, 输出的 $b \in \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$; 当 $4 \leq a < 16$ 时, 输出的 $b \in \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$; 综上, 当 $1 \leq a < 16$ 时, 输出的 $b \in \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$. 所以输出的 $b \in \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ 的概率 $P = \frac{15}{16}$. 故选 B.
- 10.D 【解析】 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 因为 $f(0) = \frac{1}{2}$, $f'(0) < 0$, 所以 $\varphi = 2k\pi + \frac{5\pi}{6}$, $k \in \mathbf{Z}$, 又 $0 < \varphi < \pi$, 所以 $\varphi = \frac{5\pi}{6}$, $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{5\pi}{6}\right)$, 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $\omega x + \frac{5\pi}{6} \in \left[\frac{5\pi}{6}, \omega\pi + \frac{5\pi}{6}\right]$, $f(x) \in \left[-1, \frac{1}{2}\right]$, 则 $\frac{3\pi}{2} \leq \omega\pi + \frac{5\pi}{6} \leq \frac{13\pi}{6}$, 解得 $\frac{2}{3} \leq \omega \leq \frac{4}{3}$. 故选 D.
- 11.C 【解析】连接 BN 并延长与 CC_1 交于 E , $\triangle BB_1N$ 与 $\triangle ECN$ 相似, 又 $A_1M = CN$, $A_1B = CB_1$, 可得 $\frac{CN}{B_1N} = \frac{NE}{BM}$, 所以 $MN \parallel A_1E$, $MN \subset$ 平面 A_1ACC_1 , $A_1E \subset$ 平面 A_1ACC_1 , 故 $MN \parallel$ 平面 A_1ACC_1 , ②正确; 当 E 与 C_1 重合时, 即当 M, N 分别为线段 A_1B, B_1C 上的中点时, $MN \perp$ 平面 BB_1D_1D , ①错误; 直线 MN 与平面 A_1ADD_1 所成角, 即直线 A_1E 与平面 A_1ADD_1 所成角, 设为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{1}{A_1E}$, A_1E 最小时, θ 最



大, 显然 $A_1E_{\text{最小}} = A_1C_1 = \sqrt{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 θ 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$, ④正确; 由题易知, $BM = B_1N$, 又直线 A_1B 和直线 B_1C 与平面 BB_1D_1D 所成的角相等, 故点 M, N 到平面 BB_1D_1D 的距离相等, ③正确. 故选 C.

12.D 【解析】 $f'(x) = 2e^x - 2ax$, 则 $f'(x) = 0$ 即 $e^x - ax = 0$, 显然 $x \neq 0$, 若方程有两个不相等的实数根 x_1 ,


$x_2 (x_1 < x_2)$, 即方程 $a = \frac{e^x}{x}$ 有两个不相等的实数根 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 即 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 的图象与直线 $y = a$ 有

两个交点, 且横坐标分别为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 又 $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 易知 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0), (0, 1)$ 上单调

递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且当 $x < 0$ 时, $g(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 所以 $a > g(1) = e$, A 错误; 当 $a > e$ 时, $g(x)$ 的图象

如图所示, 易知 $0 < x_1 < 1 < x_2$, B 错误; 若 $x_2 = 2x_1$, 则 $a = \frac{e^{x_1}}{x_1} = \frac{e^{2x_1}}{2x_1} = \frac{e^{2x_1}}{2x_1}$, 得 $x_1 = \ln 2$, 故 $a = \frac{e^{\ln 2}}{\ln 2} = \frac{2}{\ln 2}$, C 错误; 因为 $\frac{e^{x_1}}{x_1} = \frac{e^{x_2}}{x_2}$,

所以 $x_1 e^{x_2} = x_2 e^{x_1}$, 又 $0 < x_1 < 1$, 所以 $e^{x_1} > 1, x_2 > 1$, 所以 $x_2 e^{x_1} > 1$, 故 $x_1 e^{x_2} > 1$, 所以 $\ln x_1 + x_2 > 0$, D 正确. 故选 D.



13. $\frac{2\pi}{3}$ 【解析】 $(a-b)^2 = 3$, 即 $a^2 + b^2 - 2a \cdot b = 3$, 又 a, b 为单位向量, 所以 $1 + 1 - 2 \times 1 \times 1 \times \cos \theta = 3$, 所以 $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, 因为 $0 \leq$

$\theta \leq \pi$, 所以 $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

14. 3π 【解析】设该圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l , 则 $2\pi r = \pi l$, 得 $l = 2r$, 所以该圆锥的轴截面为正三角形, 又圆锥的内切圆半径为

1, 所以轴截面正三角形的内切圆半径为 1, 故 $\frac{1}{2} \times 2r \times 2r \times \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \times 6r \times 1$, 解得 $r = \sqrt{3}$, 所以圆锥的高 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = 3$, 故

该圆锥的体积 $V = \frac{1}{3} \pi \times (\sqrt{3})^2 \times 3 = 3\pi$.

15. $\frac{2\ 023}{4\ 050}$ 【解析】设 $a_n = f(n)$, $a_1 = f(1) = 2f(0) = 2$, 则 $a_{n+1} = 2a_n - n$, 即 $a_{n+1} - (n+2) = 2[a_n - (n+1)]$, 又 $a_1 = 2$, 所以 $a_{n+1} -$

$(n+2) = 2[a_n - (n+1)] = 0$, 所以 $a_n = n+1$. 故 $b_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$, 所以 $S_{2\ 023} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2\ 024} -$

$\frac{1}{2\ 025} = \frac{2\ 023}{4\ 050}$.


16.0 【解析】设直线 l 过抛物线的准线与 x 轴的交点为 M , 如图, 过点 A 作准线的垂线, 垂足

为 Q , 由直线 l 的斜率为 $\frac{5}{12}$, 易得 $\sin \angle AMF = \sin \angle MAQ = \frac{5}{13}$, 故 $\cos \angle MAQ = \frac{12}{13}$.

$\frac{|AQ|}{|AM|}$, 由抛物线的性质可得 $|AQ| = |AF|$, 所以 $\frac{|AF|}{|AM|} = \frac{12}{13}$, 在 $\triangle AFM$ 中, 由正弦定理可

得: $\frac{|AM|}{\sin \angle AFM} = \frac{|AF|}{\sin \angle AMF}$, 所以 $\sin \angle AFM = \frac{|AM|}{|AF|} \cdot \sin \angle AMF = \frac{13}{12} \cdot \frac{5}{13} = \frac{5}{12}$, 同理可得

$\sin \angle BFM = \frac{5}{12}$, 故 $\angle AFM + \angle BFM = \pi$, 所以 $k_1 + k_2 = 0$.



17. 解: (1) 随机变量 X 的所有可能取值为 $0, 2, 5, 7$.

则 $P(X=0) = \frac{C_4^2 - C_2^2}{C_4^2} \times \frac{C_3^1}{C_4^1} = \frac{5}{12}$,

$P(X=2) = \frac{C_4^1 - C_2^1}{C_4^2} \times \frac{C_3^2}{C_4^1} = \frac{5}{12}$,

$P(X=5) = \frac{C_2^2}{C_4^2} \times \frac{C_3^1}{C_4^1} = \frac{1}{12}$,

$P(X=7) = \frac{C_2^2}{C_4^2} \times \frac{C_3^1}{C_4^1} = \frac{1}{12}$, 4分

所以 X 的分布列为:

X	0	2	5	7
P	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

5分

所以 $E(X) = 0 \times \frac{5}{12} + 2 \times \frac{5}{12} + 5 \times \frac{1}{12} + 7 \times \frac{1}{12} = \frac{11}{6}$.

6分

(2) 不再选取,理由如下:

7分

如果小茗同学只选择能判断符合题目要求的那个选项为解答结果,则他本题得分为2分,

若他再随机选取1个,则他本题的得分 Y 可能为:0或2,

$$P(X=0) = \frac{1}{C_3^1} = \frac{1}{3}, P(X=2) = \frac{C_2^1}{C_3^1} = \frac{2}{3}, E(Y) = \frac{1}{3} \times 0 + \frac{2}{3} \times 2 = \frac{4}{3},$$

因为 $E(Y) < 2$,所以不再随机选取一个选项作为答题结果.

9分

若他再随机选取2个,则他本题的得分 Y 可能为:0或5,

$$P(X=0) = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_3^2} = \frac{2}{3}, P(X=5) = \frac{C_2^2}{C_3^2} = \frac{1}{3}, E(Y) = \frac{2}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times 5 = \frac{5}{3},$$

因为 $E(Y) < 2$,所以不再随机选取2个选项作为答题结果.

11分

综上,除了能判断的正确选项外,不再随机选取1个或2个选项作为答题结果.

12分

18.解:(1)由题, $B-C=A$,即 $B=A+C$,又 $A+B+C=\pi$,得 $B=\frac{\pi}{2}$,

1分

因为 $AC=2AB$,即 $\sin C = \frac{1}{2}$,

因为 $0 < C < \frac{\pi}{2}$,故 $C = \frac{\pi}{6}$,所以 $A = \frac{\pi}{3}$,如图.

因为点 A 与点 D 关于 MN 对称,所以 $\angle AMN = \angle DMN = \theta$,

且 $AM=MD$,所以 $\angle BMD = \pi - 2\theta$,

设 $AM=MD=x (0 < x < 1)$,则 $MB=1-x$,

$$AM=MD = \frac{MB}{\cos \angle BMD} = \frac{1-x}{\cos(\pi-2\theta)},$$

即 $x = \frac{1-x}{\cos(\pi-2\theta)}$,

3分

整理得 $1 - \cos 2\theta = \frac{1}{x}$,因为 $0 < x < 1$,所以 $1 - \cos 2\theta > 1$,即 $\cos 2\theta < 0$,又 $0 < 2\theta \leq \pi$,

所以 $\frac{\pi}{2} < 2\theta \leq \pi, \frac{\pi}{4} < \theta \leq \frac{\pi}{2}$,

所以 θ 的取值范围为 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$.

5分

(2)在 $\triangle AMN$ 中, $\angle ANM = \frac{2\pi}{3} - \theta$,


由正弦定理得 $\frac{AN}{\sin \theta} = \frac{AM}{\sin(\frac{2\pi}{3} - \theta)}$ ①,

7分

在 $Rt\triangle MBD$ 中, $\cos(\pi-2\theta) = \frac{1-AM}{AM}$,得 $AM = \frac{1}{2\sin^2 \theta}$ ②,

8分

由①②得 $AN = \frac{1}{2\sin \theta \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta)}$,



令 $t = 2\sin\theta \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) = \sin^2\theta + \sqrt{3}\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2\theta - \frac{1}{2}\cos 2\theta = \frac{1}{2} + \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right)$, 10分

由(1)知 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{3} < 2\theta - \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6}$,

所以当 $2\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时, t 取得最大值 $\frac{3}{2}$, 即 AN 取得最小值 $\frac{2}{3}$,

此时 $MN = AN$, 故 MN 的长度为 $\frac{2}{3}$ 12分

19.(1)证明: 因为 $CE \perp AD$, 所以 $CE \perp AE, CE \perp PE$, 又 $PE \cap AE = E, PE, AE \subset$ 平面 PAE ,

所以 $CE \perp$ 平面 $PAE, CE \subset$ 平面 $ABCE$, 所以平面 $ABCE \perp$ 平面 PAE 1分

在梯形 $ABCD$ 中, $DE = \sqrt{CD^2 - CE^2} = 2$, 所以 $AE = 2$,

所以在四棱锥 $P-ABCE$ 中, $PE = AE = 2$.

因为 $\angle PEA = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\triangle PAE$ 为正三角形.

取 AE 中点 O , 连接 PO, OB, OC , 易得 $PO \perp AE, OB \perp AE$,

由面面垂直的性质可得 $PO \perp$ 平面 $ABCE$,

所以 $PO \perp BE$ 3分

又 $BC = CE = OE = 1, CE \perp AE, CE \perp BC$, 所以四边形 $OBCE$ 为正方形, 所以 $BE \perp OC$,

又 $OC \cap PO = O, OC, PO \subset$ 平面 POC ,

所以 $BE \perp$ 平面 POC , 4分

因为 $PC \subset$ 平面 POC ,

所以 $BE \perp PC$ 5分

(2)解: 由(1)知 OA, OB, OP 两两垂直, 以 O 为坐标原点, 以 OA, OB, OP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则: $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(-1, 1, 0), P(0, 0, \sqrt{3})$, 由 $\vec{AQ} = \lambda \vec{AP}$ 得 $Q(1-\lambda, 0, \sqrt{3}\lambda) (0 \leq \lambda \leq 1)$, 6分

则 $\vec{BQ} = (1-\lambda, -1, \sqrt{3}\lambda), \vec{BC} = (-1, 0, 0)$, 设平面 QBC 的一个法向量为 $m = (x, y, z)$,

$$\begin{cases} m \cdot \vec{BQ} = 0, \\ m \cdot \vec{BC} = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} (1-\lambda)x - y + \sqrt{3}\lambda z = 0, \\ -x = 0, \end{cases} \quad \text{令 } z = 1, \text{ 得 } x = 0, y = \sqrt{3}\lambda,$$

所以 $m = (0, \sqrt{3}\lambda, 1)$, 8分

易知平面 ABC 的一个法向量为 $n = (0, 0, 1)$, 9分

$$\text{所以 } |\cos\langle m, n \rangle| = \frac{|m \cdot n|}{|m| \cdot |n|} = \frac{1}{\sqrt{3\lambda^2 + 1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \text{..... 10分}$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 或 } \lambda = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ (舍)}.$$


所以实数 λ 的值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 12分

20.解: (1) 设椭圆的焦距为 $2c (c > 0)$, 则 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, ①

$$\text{将 } x = -c \text{ 代入椭圆方程得: } \frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 解得 } y = \pm \frac{b^2}{a}, \text{ 所以 } \frac{2b^2}{a} = 3, \text{ ②} \quad \text{..... 2分}$$

$$\text{又 } a^2 = b^2 + c^2, \text{ ③}$$

综合①②③解得: $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$,



所以椭圆 M 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 4 分

(2) 存在. 5 分

设 $P(m, 0), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 直线 $l: x = ny - 1$,

联立方程:
$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \\ x = ny - 1, \end{cases} \text{ 得 } (3n^2 + 4)y^2 - 6ny - 9 = 0,$$

所以 $y_1 + y_2 = \frac{6n}{3n^2 + 4}, y_1 y_2 = \frac{-9}{3n^2 + 4}$, 7 分

$\vec{PA} = (x_1 - m, y_1), \vec{PB} = (x_2 - m, y_2),$

$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 + y_1 y_2$
 $= (ny_1 - 1)(ny_2 - 1) - m(ny_1 + ny_2 - 2) + m^2 + y_1 y_2$
 $= (n^2 + 1)y_1 y_2 - (mn + n)(y_1 + y_2) + m^2 + 2m + 1$ 9 分

$= \frac{-9(n^2 + 1)}{3n^2 + 4} - \frac{6n(mn + n)}{3n^2 + 4} + m^2 + 2m + 1 = \frac{3m^2 n^2 + 4m^2 - 12n^2 + 8m - 5}{3n^2 + 4}$
 $= \frac{m^2(3n^2 + 4) - 4(3n^2 + 4) + 8m + 11}{3n^2 + 4} = m^2 - 4 + \frac{8m + 11}{3n^2 + 4}$, 10 分

当 $8m + 11 = 0$, 即 $m = -\frac{11}{8}$ 时, $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 为定值 $-\frac{135}{64}$,

所以存在点 $P(-\frac{11}{8}, 0)$, 使得 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 为定值. 12 分

21.(1) 解: $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x+1} - a$,

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增;

且 $f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 存在唯一零点; 2 分

当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{a} - 1 > -1$,

当 $x \in (-1, \frac{1}{a} - 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (\frac{1}{a} - 1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

所以 $f(x)_{\max} = f(\frac{1}{a} - 1) = a - 1 - \ln a$, 且 $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow -\infty; x \rightarrow -1, f(x) \rightarrow -\infty$.

若 $f(x)$ 存在唯一零点, 则 $a - 1 - \ln a = 0$ 4 分

设 $h(a) = a - 1 - \ln a$, 则 $h'(a) = 1 - \frac{1}{a}$,

当 $a \in (0, 1)$ 时, $h'(a) < 0$, $h(a)$ 单调递减; 当 $a \in (1, +\infty)$ 时, $h'(a) > 0$, $h(a)$ 单调递增,

所以 $h(a) \geq h(1) = 0$, 故当 $a - 1 - \ln a = 0$ 时, $a = 1$,

所以 $f(x)$ 存在唯一零点时, 实数 a 的取值范围为 $a \leq 0$ 或 $a = 1$ 6 分

(2) 证明: 由(1)知, 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \ln(x+1) - x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $f(x) < f(0) = 0$, 即 $\ln(x+1) < x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

令 $x = 3^{-n}, n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $\ln(1 + 3^{-n}) < 3^{-n}$, 8 分

所以 $\ln[(1 + 3^{-1})(1 + 3^{-2})(1 + 3^{-3}) \dots (1 + 3^{-n})] = \ln(1 + 3^{-1}) + \ln(1 + 3^{-2}) + \ln(1 + 3^{-3}) + \dots + \ln(1 + 3^{-n})$

$< 3^{-1} + 3^{-2} + 3^{-3} + \dots + 3^{-n} = \frac{\frac{1}{3}(1 - \frac{1}{3^n})}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3^n} < \frac{1}{2}$, 10 分

所以 $\ln[(1+3^{-1})(1+3^{-2})(1+3^{-3})\cdots(1+3^{-n})] < \frac{1}{2} = \ln\sqrt{e}$,

所以当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时, $(1+3^{-1})(1+3^{-2})(1+3^{-3})\cdots(1+3^{-n}) < \sqrt{e}$ 12分

22.解:(1)由 $\rho^2 + 3\rho^2 \sin^2 \theta - 4 = 0$ 得: $\rho^2 \cos^2 \theta + 4\rho^2 \sin^2 \theta - 4 = 0$, 2分

将 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 代入得: $x^2 + 4y^2 = 4$,

所以曲线 C_1 的直角坐标方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 4分

(2)将 $\begin{cases} x = 2\sqrt{2} + t \cos \alpha, \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ 代入 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 得: $(\cos^2 \alpha + 4\sin^2 \alpha)t^2 + 4\sqrt{2}t \cos \alpha + 4 = 0$,

$\Delta = 32\cos^2 \alpha - 4 \times 4(\cos^2 \alpha + 4\sin^2 \alpha) = 0$, 7分

整理得 $\cos^2 \alpha - 4\sin^2 \alpha = 0$, 即 $(\cos \alpha - 2\sin \alpha)(\cos \alpha + 2\sin \alpha) = 0$,

得 $\cos \alpha = 2\sin \alpha$ 或 $\cos \alpha = -2\sin \alpha$, 9分

得 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ 或 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$,

所以直线 l 的斜率为 $\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$ 10分

23.解:(1)当 $a < 0$ 时, 不等式的解集为 \emptyset , 不合题意;

当 $a = 0$ 时, 不等式的解集为 $\{0\}$, 不合题意; 2分

当 $a > 0$ 时, $-a \leq 2x - a \leq a$, 即 $0 \leq x \leq a$,

因为不等式的解集为 $[0, 4]$, 所以 $a = 4$ 4分

(2)由(1)知, $m + n = 4$, 设 $m + 2n = p, 2m + n = q$,

则 $p + q = 3m + 3n = 12$, 6分

$\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) (p+q)$ 8分

$= \frac{1}{12} \left(2 + \frac{q}{p} + \frac{p}{q} \right) \geq \frac{1}{12} (2 + 2\sqrt{\frac{q}{p} \times \frac{p}{q}}) = \frac{1}{3}$,

当且仅当 $p = q$ 即 $m = n = 2$ 时, 等号成立,

所以 $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n}$ 的最小值为 $\frac{1}{3}$ 10分