


甘肃省 2024 届新高考备考模拟考试 · 数学试卷 参考答案、提示及评分细则

1. C $M = \{x | \log_2 x < 3\} = \{x | 0 < x < 8\}$, $N = \{x | x > -1\}$, 则 $M \cap N = (0, 8)$. 故选 C.
2. D 由题意得, $\bar{z}_2 = 1 - i$, 所以 $z = z_1 \cdot \bar{z}_2 = (2 + i)(1 - i) = 3 - i$, 所以复数 z 在复平面内对应的点位于第四象限. 故选 D.
3. B $\forall x \in (0, 1], a \leq b + x \Rightarrow a \leq b$, 故 A 不符合题意; $\forall x \in (0, 1], a + x < b$, 则 $a < b$, 反之不一定成立, 故 B 符合题意; 由 $\exists x \in [0, 1], a < b + x$, 无法得到 a, b 之间的大小关系, 故 C 不符合题意; $\exists x \in [0, 1], a + x \leq b \Rightarrow a \leq b$, 故 D 不符合题意. 故选 B.
4. D 当 $x < 0$ 时, $y = f(-|x|) = f(x)$, 其图象在 y 轴左侧的部分与题图 1 相同; 当 $x > 0$ 时, $y = f(-|x|) = f(-x)$, 其图象在 y 轴右侧的部分与题图 1 y 轴左侧的图象关于 y 轴对称. 故选 D.
5. C 因为 $B(4, 0)$, 且 $|AF| = |BF|$, 所以 $|AF| = 3$, 即点 A 到准线 $x = -1$ 的距离为 3, 所以点 A 的横坐标为 2, 故而 AB 中点的横坐标为 3, 从而到 y 轴的距离为 3. 故选 C.

6. A 因为 $g'(x) = 2x - 1$, 所以 $g'(1) = 1$, $f'(x) = e^x - a$, 由题意,
$$\begin{cases} f'(1) = e - a = 1, \\ f(1) = e - a + b = 0, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a = e - 1, \\ b = -1. \end{cases} \text{故}$$
 选 A.

7. B 根据题意可知第一层的积是 3, 第二层的积是 3^2 , 第三层的积是 3^4 , ..., 第 7 层的积是 3^{64} , 所以前 7 层的积是 $3 \times 3^2 \times 3^4 \times \dots \times 3^{64} = 3^{2^7 - 1} = 3^{127}$, $\lg 3^{127} = 127 \lg 3 \approx 127 \times 0.477 = 60.579$, 所以 3^{127} 最接近 10^{60} . 故选 B.

8. B 由题意可得, $PA = PB, AC = BC, PC = PC$, 所以 $\triangle PCA \cong \triangle PCB$, 则 $\angle PCA = \angle PCB$, 又 $\angle ACP = 90^\circ$, 所以 $\angle BCP = 90^\circ$, 即 $PC \perp AC, PC \perp BC$. 又 $AC \cap BC = C, AC, BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $PC \perp$ 平面 ABC . 设 $AB = AC = BC = a (0 < a < 4)$, 则 $PC = 4 - a$, 取正 $\triangle ABC$ 的外心为 O' , 三棱锥 $P - ABC$ 外接球的球心 O , 连接 OO' , 如图所示, 则 $OO' \perp$ 平面 ABC , 底面外接圆的半径 $r = \frac{a}{2 \sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3} a, OO' =$



- $\frac{1}{2} PC = 2 - \frac{a}{2}$, 所以三棱锥 $P - ABC$ 外接球的半径 $R = \sqrt{\frac{1}{3} a^2 + \left(2 - \frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{12} a^2 - 2a + 4}$. 当 $a = -\frac{-2}{2 \times \frac{7}{12}} = \frac{12}{7}$ 时, R 有最小值为 $\sqrt{\frac{16}{7}} = \frac{4}{7} \sqrt{7}$, 所以三棱锥 $P - ABC$ 外接球表面积的最小值为 $4\pi \times \left(\frac{4\sqrt{7}}{7}\right)^2 = \frac{64\pi}{7}$. 故选 B.

9. ACD $\frac{a}{c} - \frac{a}{b} = \frac{a(b-c)}{bc}$, 又 $a > 0 > b > c$, 所以 $b - c > 0, bc > 0$, 所以 $\frac{a}{c} - \frac{a}{b} > 0$, 即 $\frac{a}{c} > \frac{a}{b}$, 故 A 正确; 当 $a = 1, b = -1, c = -2$ 时, $b^{2a} < c^{2a}$, 故 B 错误; $\frac{a-b}{a-c} - \frac{b}{c} = \frac{(a-b)c - (a-c)b}{(a-c)c} = \frac{a(c-b)}{(a-c)c}$, 又 $a > 0 > b > c$, 所以 $a - c > 0, c - b < 0$, 所以 $\frac{a-b}{a-c} - \frac{b}{c} > 0$, 即 $\frac{a-b}{a-c} > \frac{b}{c}$, 故 C 正确; 因为 $a > 0 > b > c$, 所以 $a - b > 0, b - c > 0$, 所以

$a-c=a-b+b-c \geq 2\sqrt{(a-b)(b-c)}$, 当且仅当 $a-b=b-c$ 时等号成立, 故 D 正确. 故选 ACD.

10. BC 由题意知 $x = \frac{x_1+x_2+\dots+x_{10}}{10}$, $3x = \frac{x_{11}+x_{12}+\dots+x_{20}}{10}$, 所以 $x_1+x_2+\dots+x_{10}=10x$, $x_{11}+x_{12}+\dots+x_{20}=30x$, 所以 $y = \frac{x_1+x_2+\dots+x_{10}+x_{11}+x_{12}+\dots+x_{20}}{20} = \frac{10x+30x}{20} = 2x$, 故 A 错误, B 正确;

$10s^2 = (x_1-x)^2 + (x_2-x)^2 + \dots + (x_{10}-x)^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2 - 10x^2$, 所以 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2 = 10s^2 + 10x^2$. 同理 $10s^2 = x_{11}^2 + x_{12}^2 + \dots + x_{20}^2 - 10 \times (3x)^2 = x_{11}^2 + x_{12}^2 + \dots + x_{20}^2 - 90x^2$, 所以 $x_{11}^2 + x_{12}^2 + \dots + x_{20}^2 = 10s^2 + 90x^2$, 又 $x \neq 0$, 所以 $s'^2 = \frac{1}{20} \times [(x_1-y)^2 + (x_2-y)^2 + \dots + (x_{10}-y)^2 + (x_{11}-y)^2 + (x_{12}-y)^2 + \dots + (x_{20}-y)^2] = \frac{1}{20} \times (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2 + x_{11}^2 + x_{12}^2 + \dots + x_{20}^2 - 20y^2) = \frac{1}{20} \times [10s^2 + 10x^2 + 10s^2 + 90x^2 - 20 \times (2x)^2] = s^2 + x^2 > s^2$, 所以 $s' > s$, 故 C 正确, D 错误. 故选 BC.

11. AB 函数 $y=f(x)$ 的定义域为 \mathbf{R} , 且 $f(-x) = 2\sin^2(-x) - 3\sin|-x| + 1 = 2\sin^2x - 3\sin|x| + 1 = f(x)$, 所以函数 $y=f(x)$ 是偶函数, A 正确; 当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $0 < \sin x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, $f(x) = 2\sin^2x - 3\sin x + 1 = 2(\sin x - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{8}$, 令 $t = \sin x$, 由于函数 $y = 2(t - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{8}$ 在 $t \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 时单调递增, 函数 $t = \sin x$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时单调递增, 所以函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增, 故函数 $y=f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{4}, 0)$ 上单调递增, B 正确; 当 $x \in [0, \pi]$ 时, 由 $f(x) = 2\sin^2x - 3\sin x + 1 = 0$, 得 $\sin x = \frac{1}{2}$ 或 $\sin x = 1$, 所以 $x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$, 所以偶函数 $y=f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有 6 个零点, C 不正确; 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) = 2\sin^2x - 3\sin x + 1 = 2(\sin x - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{8}$, 因为 $-1 \leq \sin x \leq 1$, 所以当 $\sin x = \frac{3}{4}$ 时, $f(x)_{\min} = -\frac{1}{8}$, 当 $\sin x = -1$ 时, $f(x)_{\max} = 6$, 由于函数 $y=f(x)$ 是偶函数, 因此, 函数 $y=f(x)$ 的值域为 $[-\frac{1}{8}, 6]$, D 不正确. 故选 AB.

12. BC 对于 A 选项, 若直线 l 将圆 C 的周长平分, 则直线 l 过原点, 此时直线 l 的斜率不存在, A 选项错误; 对于 B 选项, 若圆 C 上存在两个点到直线 l 的距离为 1, 则 C 到直线 l 的距离 d 满足 $1 < d < 3$, 所以 $1 < \frac{3}{\sqrt{1+k^2}} < 3$, 解得 $-2\sqrt{2} < k < 0$ 或 $0 < k < 2\sqrt{2}$, B 选项正确; 对于 C 选项, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |CA| \cdot |CB| \cdot \sin \angle ACB = 2\sin \angle ACB$, 当 $\angle ACB = 90^\circ$ 时, $\triangle ABC$ 的面积有最大值 2, C 选项正确; 对于 D 选项, 易知直线 l 经过定点 $P(0, 3)$, 所以 $OM \perp PM$, M 点的轨迹以 OP 为直径的圆, 其方程为 $x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$, 又因为 M

点在圆 C 内, 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}, \end{cases}$ 解得 $y = \frac{4}{3}$, 所以 M 点的轨迹方程为 $x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$

$(0 < y < \frac{4}{3})$, D 选项错误. 故选 BC.

13. 16π 设圆柱底面的半径为 R , 高为 h , 则 $\begin{cases} h=2R, \\ 2\pi Rh=16\pi, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} R=2, \\ h=4, \end{cases}$ 所以圆柱的体积 $V=\pi R^2 h=16\pi$.

14. $-\frac{4}{23}$ 因为 $a \parallel b$, 所以 $-2\sin \alpha - \cos \alpha = 0$, 所以 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{\sin 2\alpha}{2\cos^2 \alpha + 3} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{5\cos^2 \alpha + 3\sin^2 \alpha} = \frac{2\tan \alpha}{5+3\tan^2 \alpha}$
 $= \frac{-1}{5+3 \times \frac{1}{4}} = -\frac{4}{23}$.

15. 丙午 因为 $13^8 + 2 = (12+1)^8 + 2 = 12^8 + C_8^1 \times 12^7 + \dots + C_8^7 \times 12 + 3$, 所以 $13^8 + 2$ 年以后地支为“午”.

因为 $13^8 + 2 = (10+3)^8 + 2 = 10^8 + C_8^1 \times 10^7 \times 3 + \dots + C_8^7 \times 10 \times 3^7 + 3^8 + 2$, 又 $3^8 + 2 = 6\,563$, $3^8 + 2$ 除以 10 余数为 3, 所以 $13^8 + 2$ 年以后天干为“丙”, 故 $13^8 + 2$ 年以后是丙午年.


16. $\frac{3}{5}$ 延长 PF_2, F_1M 交于 N 点, 连接 OM , 因为点 Q 是 $\triangle F_1PF_2$ 内切圆的圆心,

所以 PQ 平分 $\angle F_1PF_2$. 因为 $F_1M \perp PQ$, 所以 $|PN| = |PF_1| \Rightarrow M$ 为 F_1N 的中

点, 又因为 O 为 F_1F_2 的中点, $|OM| = \frac{1}{2}|F_2N| = \frac{1}{2}(|PN| - |PF_2|) =$

$\frac{1}{2}(|PF_1| - |PF_2|) = 1$. 即 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 又 $|PF_1| = |F_1F_2| = 6$, 所以 $|PF_2| = 4$, 故 $|PF_1| + |PF_2| =$

$10 = 2a, a = 5, e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$.



17. (1) 解: 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 由条件①得, $3a_2 + a_4 = 3(a_1 + d) + a_1 + 3d = 4a_1 + 6d = 64$, 即 $2a_1 + 3d = 32$.

由条件②得, $S_5 = 5a_1 + \frac{5 \times (5-1)d}{2} = 5a_1 + 10d = 100$, 即 $a_1 + 2d = 20$.

由条件③得, $S_7 = 5a_5 + 16$, 可得 $7a_1 + 21d = 5(a_1 + 4d) + 16$, 即 $2a_1 + d = 16$.

若选①②, 则 $\begin{cases} 2a_1 + 3d = 32, \\ a_1 + 2d = 20, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_1 = 4, \\ d = 8, \end{cases}$ 所以 $a_n = 4 + 8(n-1) = 8n - 4$; 4 分

若选①③, 则 $\begin{cases} 2a_1 + 3d = 32, \\ 2a_1 + d = 16, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_1 = 4, \\ d = 8, \end{cases}$ 则 $a_n = 4 + 8(n-1) = 8n - 4$; 4 分

若选②③, 则 $\begin{cases} a_1 + 2d = 20, \\ 2a_1 + d = 16, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_1 = 4, \\ d = 8, \end{cases}$ 则 $a_n = 4 + 8(n-1) = 8n - 4$; 4 分

(2) 证明: 由 $b_n - b_{n-1} = a_n = 8n - 4 (n \geq 2)$, 且 $b_1 = 3$,

当 $n \geq 2$ 时, 则 $b_n = b_1 + (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \dots + (b_n - b_{n-1}) = 3 + 12 + 20 + \dots + (8n - 4) = 3 + \frac{(8n - 4 + 12)(n - 1)}{2} = 4n^2 - 1$, 6 分

又 $b_1 = 3$ 也满足 $b_n = 4n^2 - 1$, 故对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $b_n = 4n^2 - 1$ 7 分

则 $\frac{1}{b_n} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$, 8 分

所以 $T_n = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) \right] = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) < \frac{1}{2}$,

由于 $T_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)$ 是单调递增, 所以 $T_n \geq T_1 = \frac{1}{3}$.

综上, $\frac{1}{3} \leq T_n < \frac{1}{2}$ 10分

18. 解: (1) 由题可知 $\tan B = 2 \tan A, \tan C = 3 \tan A$.

在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A = -\tan(B+C) = -\frac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \tan C}$, 2分

则 $\tan A = -\frac{2 \tan A + 3 \tan A}{1 - 6 \tan^2 A}$, 解得 $\tan^2 A = 1$, 所以 $\tan A = -1$ 或 $\tan A = 1$, 3分

当 $\tan A = -1$ 时, $\tan B = -2$, 则 A, B 均为钝角, 与 $A+B+C=\pi$ 矛盾, 故舍去, 4分

故 $\tan A = 1$, 则 $A = \frac{\pi}{4}$ 6分

(2) 由 $\tan A = 1$ 可得 $\tan B = 2, \tan C = 3$.

则 $\cos B = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 B}} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos C = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 C}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$,

所以 $\sin B = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin C = \frac{3}{\sqrt{10}}$ 8分

在 $\triangle ABC$ 中有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 则 $a = \frac{b \sin A}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} b}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{\sqrt{10}}{4} b$, 10分

则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{10}}{4} b \times b \times \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3b^2}{8} = 6$, 解得 $b = 4$ 12分

19. (1) 证明: 取 PC 中点 F , 连接 EF, FD , 如图所示.


因为 E, F 分别为 PB, PC 的中点, 所以 $EF \parallel BC, EF = \frac{1}{2} BC$.

因为四边形 $ABCD$ 是矩形, O 为棱 AD 的中点, 所以 $OD \parallel BC, OD = \frac{1}{2} BC$.

所以 $EF \parallel OD, EF = OD$, 所以四边形 $OEFD$ 是平行四边形,

所以 $OE \parallel FD$ 2分

又 $FD \subset$ 平面 $PCD, OE \not\subset$ 平面 PCD , 所以 $OE \parallel$ 平面 PCD 4分



(2) 解: 取 BC 的中点 G , 连接 OG . 因为 $\triangle PAD$ 是正三角形, O 为棱 AD 的中点, 所以 $PO \perp AD$, 又平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD, PO \subset$ 平面 PAD , 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 5分

又 $OG, OA \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PO \perp OG, PO \perp OA$ 6分

因为四边形 $ABCD$ 是矩形, O 为棱 AD 的中点, G 是 BC 的中点, 所以 $OG \perp OA$.

以 O 为坐标原点, OA, OG, OP 所在的直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系, 如图所示. 设 $AD = 2a (a > 0)$, 则 $O(0, 0, 0), P(0, 0, \sqrt{3}a), B(a, 1, 0), C(-a, 1, 0), D(-a, 0, 0)$, 所以 $E\left(\frac{a}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$,

故 $\vec{OE} = (\frac{a}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2})$, $\vec{OC} = (-a, 1, 0)$, $\vec{PD} = (-a, 0, -\sqrt{3}a)$.

设平面 OCE 的一个法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

所以 $\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \vec{OE} = \frac{a}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}a}{2}z = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \vec{OC} = -ax + y = 0, \end{cases}$ 令 $x=1$, 解得 $y=a, z = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$,

所以平面 OCE 的一个法向量 $\mathbf{n} = (1, a, -\frac{2\sqrt{3}}{3})$ 7分

设直线 PD 与平面 OCE 所成角为 θ ,

所以 $\sin \theta = |\cos \langle \mathbf{n}, \vec{PD} \rangle| = \frac{|\mathbf{n} \cdot \vec{PD}|}{|\mathbf{n}| |\vec{PD}|} = \frac{a}{\sqrt{a^2+0+3a^2} \cdot \sqrt{1+a^2+\frac{4}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{8}$, 9分

解得 $a = \sqrt{3}$, 10分

所以 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot PO = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times 1 \times 3 = 2\sqrt{3}$ 12分

20. 解: (1) 设比赛继续进行 X 局甲赢得全部奖金, 则 $X=1, 2$ 1分

$P(X=1) = \frac{3}{4}, P(X=2) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$, 故 $P_{甲} = \frac{3}{4} + \frac{3}{16} = \frac{15}{16}$, 3分

从而 $P_{甲} : P_{乙} = 15 : 1$ 4分

(2) 设比赛继续进行 Y 局甲赢得全部奖金, 则 $Y=2, 3$ 5分

$P(Y=2) = p^2, P(Y=3) = C_2^1 p^2 (1-p) = 2p^2 (1-p)$,

故 $P_{甲} = p^2 + 2p^2 (1-p) = 3p^2 - 2p^3$, 即 $f(p) = 3p^2 - 2p^3$, 8分

则 $f'(p) = 6p(1-p)$, 当 $\frac{6}{7} \leq p < 1$ 时, $f'(p) > 0$,

因此 $f(p)$ 在 $[\frac{6}{7}, 1)$ 上单调递增, 从而 $f(p) \geq f(\frac{6}{7}) = \frac{324}{343}$, 10分

所以 $P(A) = 1 - f(p) \leq \frac{19}{343} \approx 0.055 < 0.06$, 故事件 A 是小概率事件. 12分

21. 解: (1) 因为 $|OM| = |OF_1| = |OF_2|$, 所以 $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$ 1分

则 $|MF_1|^2 + |MF_2|^2 = (2c)^2, (|MF_1| - |MF_2|)^2 + 2|MF_1| \cdot |MF_2| = 4a^2 + 2|MF_1| \cdot |MF_2| = 4c^2$,

所以 $|MF_1| \cdot |MF_2| = 2b^2$, 3分

$\triangle MF_1F_2$ 的面积 $S = \frac{1}{2} |MF_1| \cdot |MF_2| = b^2 = 3$.

又 C 的离心率为 $\frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = 2$, 所以 $a^2 = 1$.

所以双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 5分

(2) ① 根据题意 $F_2(2, 0)$, 则直线 $l: m(x-2) - y = 0$,

$$\text{由} \begin{cases} y = mx - 2m, \\ x^2 - \frac{y^2}{3} = 1, \end{cases} \text{得} (3 - m^2)x^2 + 4m^2x - 4m^2 - 3 = 0,$$

$$\text{由} \begin{cases} 3 - m^2 \neq 0, \\ \Delta = 4[4m^4 + (3 - m^2)(4m^2 + 3)] > 0, \end{cases} \text{得 } m^2 \neq 3, \Delta > 0 \text{ 恒成立.} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{设 } M(x_1, y_1), N(x_2, y_2), \text{ 则 } x_1 + x_2 = \frac{4m^2}{m^2 - 3}, x_1x_2 = \frac{4m^2 + 3}{m^2 - 3}, \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{直线 } l \text{ 与双曲线 } C \text{ 的右支相交于 } M, N \text{ 不同的两点, 即} \begin{cases} x_1 + x_2 > 0, \\ x_1x_2 > 0, \end{cases}$$

$$\text{所以 } m^2 > 3, \text{ 解得 } m \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty). \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

②假设存在实数 m , 使 $\angle MON$ 为锐角, 所以 $\vec{OM} \cdot \vec{ON} > 0$, 即 $x_1x_2 + y_1y_2 > 0$,

$$\text{因为 } y_1y_2 = (mx_1 - 2m)(mx_2 - 2m) = m^2x_1x_2 - 2m^2(x_1 + x_2) + 4m^2,$$

$$\text{所以 } (1 + m^2)x_1x_2 - 2m^2(x_1 + x_2) + 4m^2 > 0,$$

$$\text{由 ① 得 } (1 + m^2)(4m^2 + 3) - 8m^4 + 4m^2(m^2 - 3) > 0, \text{ 即 } 7m^2 + 3 - 12m^2 > 0 \text{ 解得 } m^2 < \frac{3}{5},$$

$$m^2 < \frac{3}{5} \text{ 与 } m^2 > 3 \text{ 矛盾, 故不存在.} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

22. (1)解: 若 $f(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 则 $f'(x) = 2x + a \ln x + a \geq 0$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立,

$$\text{即 } a \geq -\frac{2x}{1 + \ln x} \text{ 在 } x \in (1, +\infty) \text{ 上恒成立.} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{令 } h(x) = -\frac{2x}{1 + \ln x}, x \in [1, +\infty), \text{ 所以 } h'(x) = -\frac{2(1 + \ln x) - 2x \cdot \frac{1}{x}}{(1 + \ln x)^2} = -\frac{2 \ln x}{(1 + \ln x)^2} \leq 0 \text{ 在 } x \in$$

$$[1, +\infty) \text{ 上恒成立, 所以 } h(x) \text{ 在 } [1, +\infty) \text{ 上单调递减, 所以 } h(x)_{\max} = h(1) = -2, \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } a \geq -2, \text{ 即 } a \text{ 的取值范围是 } [-2, +\infty). \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(2)证明: 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^2 + x \ln x$.

$$\text{要证 } f(x) \geq x - e^{-x}, \text{ 即证 } x^2 + x \ln x \geq x - e^{-x}, \text{ 即证 } x + \ln x + \frac{1}{xe^x} - 1 \geq 0, \text{ 即 } \ln(xe^x) + \frac{1}{xe^x} - 1 \geq 0,$$

$$\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{令 } xe^x = t, t > 0, \text{ 即证 } \ln t + \frac{1}{t} - 1 \geq 0. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{令 } g(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1, t \in (0, +\infty), \text{ 所以 } g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} = \frac{t-1}{t^2}, \text{ 令 } g'(t) = 0, \text{ 解得 } t = 1,$$

当 $0 < t < 1$ 时, $g'(t) < 0$, 所以 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减; 当 $t > 1$ 时, $g'(t) > 0$,

$$\text{所以 } g(t) \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上单调递增,} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{所以当 } t = 1 \text{ 时, } g(t) \text{ 取得极小值即最小值, 所以 } g(t) \geq g(1) = 0,$$

$$\text{即 } \ln t + \frac{1}{t} - 1 \geq 0, \text{ 所以 } f(x) \geq x - e^{-x}. \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址：www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



Q 自主选拔在线

