

## 2024 届高三一轮复习联考(二) 辽宁卷

### 化学参考答案及评分意见

1.B 【解析】制取高度酒的方法是蒸馏,蒸馏是利用沸点不同,酒精的沸点比水的低,A 正确;SiO<sub>2</sub>不导电,用作光导纤维是传递的光信号,B 错误;维生素 C 用作食品中的防腐剂,是因为维生素 C 有较强的还原性,C 正确;Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在空气中性质稳定,常用作颜料和油漆,D 正确。

2.D 【解析】碘单质遇淀粉变蓝色是特性,不能推断溴单质遇淀粉也变蓝色,A 错误;Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>在空气中易变质,是因为+4 价硫元素很容易被氧化,而碳酸钠在空气中非常稳定,B 错误;HF 是弱酸,C 错误;同族元素的氢化物由上往下还原性增强,D 正确。

3.A 【解析】NO 在水中的溶解度较小,可用排水法收集,A 正确;Fe(OH)<sub>3</sub>胶体不是沉淀,不能用过滤的方法提纯,B 错误;用图中所给装置制取的 CO<sub>2</sub> 中有 HCl 杂质,NaAlO<sub>2</sub> 溶液中产生沉淀,不能证明是由 CO<sub>2</sub> 产生的沉淀,也可能是由 HCl 产生的沉淀,C 错误;加热固体不能用蒸发皿,应该用坩埚,另外加热 FeCl<sub>2</sub> · 6H<sub>2</sub>O 制取无水 FeCl<sub>2</sub> 应该在 HCl 的气流下加热,D 错误。

4.C 【解析】A 项,加入蒸馏水,呈蓝色的是无水硫酸铜,不溶于水的是硫酸钡,溶液呈无色的是硫酸钠,可以检验;B 项,加入蒸馏水,Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 与水反应产生无色无味气体,碳酸钠中滴加少量水会结成块状生成 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> · 10H<sub>2</sub>O,NaHCO<sub>3</sub> 中滴加少量水不会结成块状,可以检验;C 项,加入蒸馏水,均得到无色溶液,不能检验;D 项,浓硫酸是粘稠液体,并且溶于水放出大量热,NaOH 溶液与水混合不分层,苯与水混合分层,可以检验。

5.A 【解析】84 消毒液的有效成分是 NaClO,不是 NaClO<sub>3</sub>,A 错误;用酵母菌可以催化面粉发酵,B 正确;钢铁生锈需要 O<sub>2</sub> 和 H<sub>2</sub>O,将铁丝分别放在有水和无水环境中观察较长时间,验证钢铁在有水存在的条件下更容易生锈,C 正确;厨房纸巾比普通纸巾表面积大,吸附油污能力强,D 正确。

6.D 【解析】向 NaAlO<sub>2</sub> 溶液中通入过量 CO<sub>2</sub> 生成的产物是 Al(OH)<sub>3</sub> 沉淀和 NaHCO<sub>3</sub>,A 错误;NaHSO<sub>4</sub> 应拆写成 Na<sup>+</sup> + H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>,B 错误;向 NaNO<sub>3</sub> 溶液中通入 SO<sub>2</sub>,酸性条件下 NO<sub>3</sub><sup>-</sup> 将 SO<sub>2</sub> 氧化为 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>,NO<sub>3</sub><sup>-</sup> 中氮元素被还原为 NO,C 错误;当 n(Fe) : n(HNO<sub>3</sub>) = 1 : 4 时,发生的反应为 Fe + NO<sub>3</sub><sup>-</sup> + 4H<sup>+</sup> = Fe<sup>3+</sup> + NO↑ + 2H<sub>2</sub>O,当 n(Fe) : n(HNO<sub>3</sub>) = 1 : 3 时,可假设是 3 mol HNO<sub>3</sub>,消耗 0.75 mol Fe,生成 0.75 mol Fe<sup>3+</sup>,再加入 0.25 mol Fe,则生成 0.75 mol Fe<sup>2+</sup>,剩余 0.25 mol Fe<sup>3+</sup>,即溶液中 n(Fe<sup>2+</sup>) : n(Fe<sup>3+</sup>) = 3 : 1,由此可得离子方程式为 4Fe + 3NO<sub>3</sub><sup>-</sup> + 12H<sup>+</sup> = 3Fe<sup>2+</sup> + Fe<sup>3+</sup> + 3NO↑ + 6H<sub>2</sub>O,D 正确。

7.C 【解析】环丁烷与环丙烷的最简式均为 CH<sub>2</sub>,1.4 g CH<sub>2</sub> 的物质的量为 0.1 mol,含有的氢原子数为 0.2N<sub>A</sub>,A 正确;标准状况下,22.4 L 气体物质的量是 1 mol,Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub> 和 CO 均为双原子分子,所以混合气体中含有 2N<sub>A</sub> 个原子,B 正确;100 g 质量分数为 32% 的甲醇溶液中含有甲醇的质量是 32 g,物质的量是 1 mol,1 mol CH<sub>3</sub>OH 所含的氢原子数为 4N<sub>A</sub>,但 100 g 溶液中还有 68 g H<sub>2</sub>O,水分子中也含有氢原子,所以 100 g 溶液中含有的氢原子数大于 4N<sub>A</sub>,C 错误;铁粉与硫、碘反应均生成+2 价铁元素,所以 5.6 g 的铁粉分别与足量硫粉、碘单质充分反应,转移的电子数均为 0.2N<sub>A</sub>,D 正确。


8.D 【解析】由图 2 可知 CO(g) +  $\frac{1}{2}$ O<sub>2</sub>(g) = CO<sub>2</sub>(g) ΔH = -285 kJ · mol<sup>-1</sup>,A 正确;

由图 1 可得 ① H<sub>2</sub>O(g) = H<sub>2</sub>(g) +  $\frac{1}{2}$ O<sub>2</sub>(g) ΔH = +243 kJ · mol<sup>-1</sup>,

由图 2 可得 ② C(s) +  $\frac{1}{2}$ O<sub>2</sub>(g) = CO(g) ΔH = -109 kJ · mol<sup>-1</sup>,

根据盖斯定律①+②得, C(s) + H<sub>2</sub>O(g) = CO(g) + H<sub>2</sub>(g) ΔH = +134 kJ · mol<sup>-1</sup>,B 正确;


由图 1 或图 2 均可得出  $O=O$  的键能为  $494 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , C 正确;



9.C 【解析】钢铁的腐蚀中正极电极反应式为  $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$ , A 正确;酸雨地区雨水中的电解质浓度大,会加快钢铁的腐蚀, B 正确;  $\text{Fe(OH)}_2$  生成  $\text{FeO(OH)}$  反应的化学方程式为  $4\text{Fe(OH)}_2 + \text{O}_2 = 4\text{FeO(OH)} + 2\text{H}_2\text{O}$ , C 错误;结合题干信息,铁锈中的硫酸盐加速电子传递,有一定的催化剂作用,D 正确。

10.C 【解析】铁的还原性比铜的强,而常温下,铁片与浓硝酸会发生钝化,导致现象不明显,A 错误;向碳酸钙的悬浊液中通入无色气体,悬浊液逐渐变澄清,气体不一定是  $\text{HCl}$ ,也可能是  $\text{CO}_2$  等,B 错误;铁比银活泼,在组成的原电池中铁作负极,铁失电子产生的  $\text{Fe}^{2+}$  与  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  反应生成蓝色沉淀,C 正确;溴水、碘水由于浓度不同,溶液均有可能呈现黄色,所以向某无色溶液中通入  $\text{Cl}_2$ ,溶液变黄色,不能证明原溶液中有  $\text{Br}^-$ ,D 错误。

11.A 【解析】阳极泥“焙烧”时,硫化亚铜与氧气高温条件下反应生成氧化铜、二氧化硫,反应的化学方程式为



12.B 【解析】反应 I 的活化能大于反应 II 的活化能,所以反应 I 为决速步骤,A 正确;图中给出的是单个  $\text{NaHSO}_3$  反应的能量变化,而热化学方程式表示的是 1 mol  $\text{NaHSO}_3$  参与反应的能量变化,B 错误;结合图像可知反应 I 的离子方程式为  $\text{HSO}_3^- + \text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{HNO}_2 + \text{SO}_3^-$ , C 正确; $\text{HSO}_3^-$  与  $\text{NO}_2$  发生的总反应的离子方程式为  $\text{HSO}_3^- + 2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{HNO}_2 + \text{HSO}_4^-$ , 所以消耗 1 mol  $\text{NaHSO}_3$  可处理含 2 mol  $\text{NO}_2$  的废气,其质量是 92 g,D 正确。

13.B 【解析】检验溶液中的  $\text{SO}_4^{2-}$  需要先加盐酸,排除  $\text{Ag}^+$ 、 $\text{SO}_3^{2-}$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$  等离子的干扰,再加入  $\text{BaCl}_2$  溶液,A 错误;图示中  $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$  在酸性条件下氧化  $\text{SO}_2$ ,结合得失电子守恒和电荷守恒,质量守恒可以写出反应的离子方程式为  $2\text{Ce}^{4+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Ce}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$ , B 正确;反应②中氧化剂是  $\text{O}_2$ ,氧化产物是  $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ ,根据得失电子守恒可判断二者的物质的量之比为 1 : 4,C 错误;根据总反应  $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Ce}(\text{SO}_4)_2} 2\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $n(\text{O}_2) = 0.5n(\text{SO}_2) = 0.5 \times \frac{224 \times 10^{-3} \text{ L}}{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.005 \text{ mol}$ ,  $m(\text{O}_2) = 0.005 \text{ mol} \times 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.16 \text{ g}$ , D 错误。

14.B 【解析】若要产生葡萄糖酸,则②室中的  $\text{GCOO}^-$  移向③室,双极膜中的膜 c 产生的  $\text{H}^+$  进入③室,最终在③室中生成  $\text{GCOOH}$ ,所以膜 b 是阴离子交换膜;②室中的  $\text{Na}^+$  进入①室,同时电极 M 处产生  $\text{OH}^-$ ,①室中产生  $\text{NaOH}$ ,所以膜 a 为阳离子交换膜,M 为阴极,A、C 正确;⑤室中的  $\text{GCOO}^-$  移向⑥室,N 电极上产生  $\text{H}^+$ ,电极反应式为  $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{H}^+ + \text{O}_2 \uparrow$ , D 正确;⑤室中的  $\text{Na}^+$  进入④室,双极膜中的膜 d 产生的  $\text{OH}^-$  进入④室,④室中的产物为  $\text{NaOH}$ ,B 错误。

15.D 【解析】放电时,负极反应为  $\text{Al} - 3\text{e}^- + 7\text{AlCl}_4^- \rightleftharpoons 4\text{Al}_2\text{Cl}_7^-$ , 正极反应为  $\text{S} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{S}^{2-}$ , 总反应为  $2\text{Al} + 3\text{S} + 14\text{AlCl}_4^- \rightleftharpoons 8\text{Al}_2\text{Cl}_7^- + 3\text{S}^{2-}$ , A、B 正确;充电时,阴极反应为  $4\text{Al}_2\text{Cl}_7^- + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al} + 7\text{AlCl}_4^-$ , 阳极反应为  $\text{S}^{2-} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{S}$ ;离子交换膜两侧阳离子相同,因此选用阳离子交换膜,C 正确;充电时,M 极为阳极, $\text{Al}_2\text{Cl}_7^-$  在阴极被还原,D 错误。

16.(14 分)


(1) 高于 50 °C 时盐酸挥发,  $\text{H}_2\text{O}_2$  分解(1 分) 作光导纤维、石英坩埚等(1 分)



(3) C(2 分)

(4) 1 : 1(2 分)

(5)  $\frac{140a - 840b}{w}\% \text{ (或 } \frac{1.4a - 8.4b}{w} \times 100\%)$  (2 分)



**【解析】**(1) 辉铋矿主要成分为  $\text{Bi}_2\text{S}_3$ , 含  $\text{FeS}$ 、 $\text{CuO}$ 、 $\text{SiO}_2$  等杂质, 向辉铋矿中加入  $\text{H}_2\text{O}_2$  和盐酸进行“氧化浸取”, 发生的反应有:  $\text{Bi}_2\text{S}_3 + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Bi}^{3+} + 3\text{S} + 6\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{FeS} + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{S} + 6\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CuO} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ , 得到含 S 和  $\text{SiO}_2$  的滤渣 1。高于 50 ℃时浸取速率下降, 其可能的原因是盐酸挥发,  $\text{H}_2\text{O}_2$  分解。

(2) “氧化浸取”时,  $\text{FeS}$  与  $\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $\text{H}^+$  发生反应:  $2\text{FeS} + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{S} + 6\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 该工艺主要是提取 Bi 并制取  $\text{NaBiO}_3$ , 从不引入杂质的角度考虑加入  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  最好。

(4) 除铜后得到氢氧化铋沉淀, 加入盐酸溶解滤渣, 再加入  $\text{NaOH}$ 、 $\text{NaClO}$ , 发生反应  $\text{Na}^+ + \text{ClO}^- + \text{Bi}^{3+} + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{NaBiO}_3 \downarrow + \text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ , 得到产品  $\text{NaBiO}_3$ 。氧化剂和氧化产物的物质的量之比为 1 : 1。


(5)  $\text{NaBiO}_3$  中加入稀硫酸和  $\text{FeSO}_4$  溶液, Bi 被还原为 +3 价, 根据得失电子守恒可得关系式  $\text{NaBiO}_3 \sim 2\text{FeSO}_4$ , 剩余的  $\text{Fe}^{2+}$  与  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  反应, 二者的关系式为  $6\text{Fe}^{2+} \sim \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , 所以  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  消耗的  $\text{Fe}^{2+}$  的物质的量为 0.06b mol,  $\text{NaBiO}_3$  消耗的  $\text{FeSO}_4$  的物质的量为  $(0.01a - 0.06b)$  mol,  $\text{NaBiO}_3$  的物质的量为  $\frac{0.01a - 0.06b}{2}$  mol, 该

$$\text{产品的纯度为 } \frac{280 \times \frac{0.01a - 0.06b}{2}}{w} \times 100\% = \frac{140a - 840b}{w}\%.$$

(6) 原电池装置中电流由正极流向负极, 所以石墨 2 是负极, 电极反应式为  $\text{Mn}^{2+} - 5\text{e}^- + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+$ 。


17.(14 分)

(1) 球形干燥管(1 分) f → e → j → i → h(或 g) → g(或 h) → b → c → d(2 分)



(3) 吸收挥发出的硝酸蒸气和产生的  $\text{NO}_2$  (2 分)

(4) 红色粉末变为黑色(1 分)



**【解析】**首先利用铜与稀硝酸反应生成 NO, 由于硝酸具有挥发性, 所以制得的 NO 中会混有硝酸蒸气, 故先将产生的气体通过装置 D 除去可能产生的  $\text{NO}_2$  和挥发出的硝酸蒸气, 再通过装置 F 干燥, 得到纯净干燥的 NO, 然后进入装置 E 中与铜粉反应, 最后处理多余的 NO。由于 NaOH 溶液不与 NO 反应, 而浓硝酸可将 NO 氧化为  $\text{NO}_2$ , 所以先通过装置 B 氧化 NO, 再通过装置 C 吸收。


(1) 装置 F 的名称为球形干燥管, 上述装置的连接顺序为 a → f → e → j → i → h(或 g) → g(或 h) → b → c → d。

(2) 装置 A 中稀硝酸与铜粉反应的离子方程式为  $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 。C 中发生反应的离子方程式为  $2\text{NO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{NO}_3^- + \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$ 。



(3) 装置 D 的作用为吸收挥发出的硝酸蒸气和产生的  $\text{NO}_2$ 。

(4) 反应一段时间后装置 E 的铜粉变为 CuO, 故观察到的现象为红色粉末变为黑色。


(5) 根据题意可知, 在加热条件下 CuO 与氨气反应生成  $\text{H}_2\text{O}$ , 所以反应的化学方程式为




18.(14分)



(3) 加入足量稀盐酸,充分反应,溶液中仍有黑色固体剩余(答案合理即可)(2分)



【解析】(1)溶液中的  $\text{Fe}^{3+}$  常用 KSCN 溶液检验,溶液中  $\text{Fe}^{2+}$  被氧化为  $\text{Fe}^{3+}$  的离子方程式为





(2) 对比实验应做到只有1个变量,所以选用 0.05 mol · L<sup>-1</sup> 的硝酸钠溶液。


(3) 剩余固体中可能有铁粉,所以应用稀盐酸或稀硫酸将其溶解后,若仍有固体剩余,则证明黑色固体中含有 Ag。

(4) 证明  $\text{Ag}^+$  可以将  $\text{Fe}^{2+}$  氧化为  $\text{Fe}^{3+}$ ,则原电池中负极发生的电极反应一定是  $\text{Fe}^{2+} - \text{e}^- \xrightarrow{} \text{Fe}^{3+}$ ,正极发生的电极反应一定是  $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \xrightarrow{} \text{Ag}$ ;电流表指针反向偏转后,石墨电极为正极,发生的电极反应一定是  $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \xrightarrow{} \text{Fe}^{2+}$ ,Ag 电极是负极,发生的电极反应一定是  $\text{Ag} - \text{e}^- \xrightarrow{} \text{Ag}^+$ 。

19.(13分)



(3) 946(1分)



【解析】(1) ②-①×2 可得  $\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{} \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ ,

所以  $\Delta H = -290 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (-184.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \times 2 = +79.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2)  $\frac{\text{②} + \text{①} \times 3}{4}$  可得出  $\text{NH}_3(\text{g}) + \frac{3}{4}\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{} \frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) + \frac{3}{2}\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ , 所以  $\Delta H = \frac{-2317 + 230 \times 3}{4} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -406.75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。碱性条件下  $\text{NH}_3$  在负极上失电子,电极反应式为  $2\text{NH}_3 + 6\text{OH}^- - 6\text{e}^- \xrightarrow{} \text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 。

(3)  $\Delta H = \text{反应物的键能之和} - \text{生成物的键能之和} = 4 \times 391 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 193 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 2 \times 243 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 4 \times 432 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 所以  $a = 946$ 。

(4) 能量越低越稳定,所以最稳定的是  ;根据图像可以看出  (l)  $\xrightarrow{} \text{cyclic dimer of benzene}$  (l)  $\Delta H = -10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(5) 电解时阴极产生  $\text{H}_2$  和  $\text{OH}^-$ ,电极反应式为  $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \xrightarrow{} \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ;阳极产生  $\cdot \text{OH}$ ,1个  $\cdot \text{OH}$  在反应中得1个  $\text{e}^-$  生成  $\text{OH}^-$ ,所以  $\cdot \text{OH}$  与二氯乙烷反应的化学方程式为  $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2 + 10 \cdot \text{OH} \xrightarrow{} 2\text{CO}_2 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O} + 2\text{HCl}$ 。