

# 2023年高三下学期5月三校联考

## 高三数学试卷

命题学校：宜昌一中 命题教师：高三数学备课组 审题学校：荆州中学、龙泉中学

考试时间：2023年5月18日下午15:00—17:00

试卷满分：150分

★祝考试顺利★

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合  $A = \{x | a < x < 2, x \in \mathbb{Z}\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1, 2\}$ , 若  $A \cap B$  中恰有两个元素，则实数  $a$  的取值范围为  
A.  $[-1, 0)$       B.  $[-1, 0]$       C.  $[0, 1)$       D.  $[0, 1]$
2. 已知复数  $2+i$  是关于  $x$  的方程  $x^2 - ax - b = 0$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) 的一个解，则复数  $z = a + bi$  在复平面内对应的点位于  
A. 第一象限      B. 第二象限      C. 第三象限      D. 第四象限
3. 已知平面向量  $a$ ,  $b$ ,  $c$  满足  $a = (2, 1)$ ,  $b = (1, 2)$ , 且  $a \perp c$ . 若  $b \cdot c = 3\sqrt{2}$ , 则  $|c| =$   
A.  $\sqrt{10}$       B.  $2\sqrt{5}$       C.  $5\sqrt{2}$       D.  $3\sqrt{5}$
4. 由经验可知，某种质地的沙子堆放成圆锥的形状，若要使沙堆上的沙子不滑落，其母线与底面的最大夹角为  $\frac{\pi}{6}$ . 现有一堆该质地的沙子堆成的沙堆，该沙堆的底面半径为3m，高为1m. 现在为了节省该沙堆的占地，需要用一个无盖的圆柱形容器盛放这些沙子，沙子可以超出该容器，且超出部分呈圆锥形. 已知该容器的底面半径为  $\sqrt{3}$  m，则该容器的高至少为  
A. 1m      B.  $\frac{2}{3}$ m      C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ m      D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ m
5. 若  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\cos(\alpha - \frac{2\pi}{5}) + 2\cos\alpha = 4\cos\alpha \cdot \cos^2 \frac{\pi}{5}$ , 则  $\alpha$  等于  
A.  $\frac{2\pi}{5}$       B.  $\frac{3\pi}{10}$       C.  $\frac{\pi}{5}$       D.  $\frac{\pi}{10}$
6. 某同学喜爱球类和游泳运动. 在暑假期间，该同学上午去打球的概率为  $\frac{1}{3}$ . 若该同学上午不去打球，则下午一定去游泳；若上午去打球，则下午去游泳的概率为  $\frac{1}{4}$ . 已知该同学在某天下午去游泳，则上午打球的概率为  
A.  $\frac{3}{4}$       B.  $\frac{2}{3}$       C.  $\frac{1}{3}$       D.  $\frac{1}{2}$
7. 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1$ ,  $F_2$ , 过  $F_2$  的直线与  $E$  交于点  $A$ ,  $B$ . 直线  $l$  为  $E$  在点  $A$  处的切线，点  $B$  关于  $l$  的对称点为  $M$ . 由椭圆的光学性质知， $F_1$ ,  $A$ ,  $M$  三点共线. 若  $|AB| = a$ ,  $\frac{|BF_1|}{|MF_1|} = \frac{5}{7}$ , 则  $\frac{|BF_2|}{|AF_1|} =$   
A.  $\frac{1}{2}$       B.  $\frac{2}{7}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{1}{7}$

8. 设函数  $f(x) = 2x^3 - 2x$ , 若正实数  $a$  使得存在三个两两不同的实数  $b, c, d$  满足  $(a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c)), (d, f(d))$  恰好为一个矩形的四个顶点, 则  $a$  的取值范围为

A.  $(0, \frac{1}{2})$       B.  $[\frac{1}{2}, 1]$       C.  $(0, \frac{\sqrt{3}}{3})$       D.  $[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1]$

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分.

9. 已知正四棱锥  $P-ABCD$  的所有棱长相等,  $M, N$  分别是棱  $PD, BC$  的中点, 则

A.  $MN \parallel PB$       B.  $MN \parallel \text{面 } PAB$   
C.  $MN \perp PA$       D.  $MN \perp \text{面 } PAD$

10. 某学校一同学研究温差  $x(^{\circ}\text{C})$  与本校当天新增感冒人数  $y$  (人) 的关系, 该同学记录了 5 天的数据:

$x$	5	6	8	9	12
$y$	17	20	25	28	35

经过拟合, 发现基本符合经验回归方程  $\hat{y} = 2.6x + \hat{a}$ , 则

- A. 样本中心点为  $(8, 25)$       B.  $\hat{a} = 4.2$   
C.  $x=5$  时, 残差为 -0.2      D. 若去掉样本点  $(8, 25)$ , 则样本的相关系数  $r$  增大

11. 已知函数  $f(x) = \sin(2x + \varphi)$  ( $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ) 在  $(0, \frac{\varphi}{2})$  上有最大值, 则

- A.  $\varphi$  的取值范围为  $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$       B.  $f(x)$  在区间  $(0, \varphi)$  上有零点  
C.  $f(x)$  在区间  $(\frac{\varphi}{2}, \varphi)$  上单调递减      D. 存在两个  $\varphi$ , 使得  $\varphi - f(\varphi) = 1$

12. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知点  $P(x_1, y_1)$  ( $y_1 > 0$ ) 是圆  $M: (x-2)^2 + y^2 = 1$  上的一个动点, 直线  $OP$  与圆  $M$  交于另一点  $Q$ , 过点  $O$  作直线  $OP$  的一条垂线, 与圆  $N: (x+2)^2 + y^2 = 4$  交于点  $E(x_2, y_2)$ , 则下列说法正确的是

- A.  $x_2 > -1$       B.  $4y_1 = OP \cdot OE$   
C. 若  $PQ = OE$ , 则  $S_{\triangle NOE} = 3S_{\triangle AMQ}$       D.  $\angle PEQ$  的最大正切值为  $\frac{2\sqrt{21}}{21}$

三、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 把答案填在答题卡中的横线上.

13. 已知  $(2x^3 + \frac{1}{x})^n$  的展开式的第 7 项为常数项, 则正整数  $n$  的值为 \_\_\_\_\_.

14. 若函数  $f(x) = e^{x-a+1} - x$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递增, 则  $a$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

15. 科拉茨是德国数学家, 他在 1937 年提出了一个著名的猜想: 任给一个正整数  $n$ , 如果  $n$  是偶数, 就将它减半 (即  $\frac{n}{2}$ ); 如果  $n$  是奇数, 则将它乘 3 加 1 (即  $3n+1$ ), 不断重复这样的运算, 经过有限步后, 一定可以得到 1. 这是一个很有趣的猜想, 但目前还没有证明或否定. 如果对正整数  $n$  (首项) 按照上述规则施行变换后的第 8 项为 1 (注: 1 可以多次出现), 则满足条件的  $n$  的所有不同值的和为 \_\_\_\_\_.

16. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ ,  $A, B$  是其准线上的两个动点, 且  $FA \perp FB$ , 线段  $FA, FB$  分别与抛物线  $C$  交于  $P, Q$  两点. 记  $\triangle PQF$  的面积为  $S_1$ ,  $\triangle ABF$  的面积为  $S_2$ , 当  $\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{9}$  时,  $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$ .

四、解答题: 本大题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (10 分)

已知数列  $\{a_n\}$  的各项均不为 0, 其前  $n$  项和  $S_n$  满足  $a_n a_{n+1} = 4S_n - 1$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , 且  $a_1 = 1$ .

(1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式;

(2) 求数列  $\left\{\frac{a_{n+1}}{S_n S_{n+1}}\right\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ .

18. (12 分)

在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 面积为  $S$ , 已知  $6S = b(a+c)$ .

(1) 若  $\sin A = \frac{2}{3}$ , 求  $\cos B$ ;


(2) 若  $b=3$ ,  $B=\frac{\pi}{3}$ , 求  $\triangle ABC$  的面积  $S$ .

19. (12 分)

如图, 在三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $B_1C \perp$  平面  $ABC$ , 点  $D$  为棱  $AC$  的中点,  $DA=DB=2$ .


(1) 求证:  $AB \perp CC_1$ ;

(2) 若  $BC=2$ , 求直线  $BB_1$  与平面  $BDC_1$  所成角的正弦的最大值.



20. (12 分)

某手机 APP 公司对喜欢使用该 APP 的用户年龄情况进行调查，随机抽取了 100 名喜欢使用该 APP 的用户，年龄均在 [15, 65] 周岁内，按照年龄分组得到如下所示的样本频率分布直方图：



(1) 根据频率分布直方图，估计使用该视频 APP 用户的平均年龄的第 85% 分位数（小数点后保留 2 位）；

(2) 若所有用户年龄  $X$  近似服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中  $\mu$  为样本平均数的估计值， $\sigma \approx 10.5$ ，试估计喜欢使用该 APP 且年龄大于 61 周岁的人数占所有喜欢使用该 APP 的比例；

(3) 用样本的频率估计概率，从所有喜欢使用该 APP 的用户中随机抽取 8 名用户，用  $P(X=k)$  表示这 8 名用户中恰有  $k$  名用户的年龄在区间 [25, 35] 岁的概率，求  $P(X=k)$  取最大值时对应的  $k$  值。

附：若随机变量  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，则： $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$ ，

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545, \quad P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973.$$

21. (12 分)

已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ，直线  $l: x=1$ ， $l$  与  $x$  轴交于点  $H$ ，

$l$  与双曲线  $C$  的一条渐近线交于点  $T$ ，且  $\overline{HF}_1 + 3\overline{HF}_2 = 0$ ， $\overline{TF}_1 \cdot \overline{TF}_2 = -2$ 。

(1) 求双曲线  $C$  的方程；

(2) 设过点  $H$  与  $x$  轴不重合的直线交双曲线  $C$  于  $A, B$  两点，直线  $AF_2, BF_2$  分别交  $l$  于点  $M, N$ ，  
求证： $|HM| = |HN|$ 。

22. (12 分)

设函数  $f(x) = e^x + b \sin x, \quad x \in (-\pi, +\infty)$ 。

(1) 若函数  $f(x)$  在  $(0, f(0))$  处的切线的斜率为 2。

①求实数  $b$  的值；

②求证： $f(x)$  存在唯一极小值点  $x_0$  且  $f(x_0) > -1$ 。

(2) 当  $b > 0$  时，若  $f(x)$  在  $x \in (-\pi, +\infty)$  上存在零点，求实数  $b$  的取值范围。