

## 地理参考答案

一、选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	C	A	B	C	A	D	B	C	D	A	A	C	B	A

二、非选择题（本大题共4小题，共55分）

16. (1) 都市区盲目扩张，使乡村人口外迁造成乡村空心化、耕地撂荒、小城镇收缩；导致物资需求增加造成森林减少、草场退化、城郊农业发展。

(2) 加强农田基本建设，提高耕地质量，严禁无序开垦；鼓励农林牧渔多元发展，发展立体农业；保护山区自然景观发展生态旅游业；发展农产品深加工，增加就业机会，提高农民经济收入。

17. (1) 与其它地区相比，裸岩地地处山脊，坡度大，径流速度快，侵蚀严重；植被稀疏，保持水土能力差。

(2) 山脊分布区：在山顶、山脊适宜封禁；山坡适宜种植等高草灌阻断水土流失。

砂岩分布区：在基岩裸露地适宜封禁；裂隙处可开挖小穴播草。

泥岩分布区：在薄层土壤区适宜浅层播草。

下坡和坡脚：土壤发育适宜种植灌木乔木。

(3) 增加就业机会及农民收入；提升旅游文化品质；增强生态环境保护意识，加强生态保护的责任心和生态体验。

18. (1) 地壳运动、流水侵蚀。

(2) 绘图：阴影绘制在天山山脉与隆起带之间区域。

原因：该区域位于山前冲积扇地带，地表物质疏松，地表水易下渗；地处凹陷谷地，且受前端隆起带阻挡，地下水易汇集。

(3) 早期，河流携带大量碎屑物在山前出山口处沉积形成冲积扇。中期，山前隆起，阻碍了冲积扇向南延伸，碎屑物主要堆积在隆起带北部。后期，随着流水下切加剧，河流穿越隆起带，碎屑物在其南侧堆积形成冲积扇，从而在天山山前形成了多级冲积扇体。

19. (1)

拦河闸	频率	天然径流量	生态需水量	可下泄量	亏缺量
三家店	多年平均	14.43	2.6	1.31	1.29
	75%年份	11.26		0.7	1.9
	95%年份	6.74		0.17	2.43

(2) 第1空：存在生态需水的亏缺情况，制约了京津冀地区经济社会的健康发展

第2空：削减地表水开发利用量、控制地下水开采量

第3空：修建引水工程、跨流域调水工程，缓解永定河缺水问题；修建治污工程，治理污染，提高水资源利用率

第4空：推广节水技术，在工农业生产中提高水资源利用率；发展治污技术，提高水资源污染治理水平，促进水资源循环利用