


2023~2024 学年高三核心模拟卷(中)

数学(一)参考答案

1. D 复数 $z = \frac{-1+3i}{1+i} = \frac{(-1+3i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1+2i$, $\therefore \bar{z} = 1-2i$, \therefore 在复平面内复数 \bar{z} 所对应的点为 $(1, -2)$, 位于第四象限. 故选 D.
2. C 由题意知 $A = \{x | x > 1\}$, $B = \{x | x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 2\}$, 所以 $A \cap B = \{x | x \geq 2\} \neq \emptyset$, 故 A 错误; $A \cup B = \{x | x \leq -3 \text{ 或 } x > 1\} \neq \mathbf{R}$, 故 B 错误; $\complement_{\mathbf{R}} B = \{x | -3 < x < 2\}$, 故 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = (1, 2)$, 故 C 正确; $\complement_{\mathbf{R}} B \not\subset A$, 故 D 错误. 故选 C.
3. D 由题意知 $a \cdot b = -x+4=0$, 解得 $x=4$, 所以 $b=(4, 2)$, $a+b=(3, 4)$, 所以 $\cos \langle b, a+b \rangle = \frac{b \cdot (a+b)}{|b| \cdot |a+b|} = \frac{20}{2\sqrt{5} \times 5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 故选 D.
4. B 由 $\frac{|c|}{a} > \frac{|c|}{b}$, 可得 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, 因为 a, b 的符号不确定, 推不出 $a < b$, 故 A 不满足题意; 由 $ac^2 < bc^2$, 可得 $a < b$, 反之不成立, 故“ $ac^2 < bc^2$ ”是“ $a < b$ ”的充分不必要条件, 故 B 满足题意; 因为 $a^3 < b^3 \Leftrightarrow a < b$, $3^a < 3^b \Leftrightarrow a < b$, 所以 C, D 不满足题意. 故选 B.
5. C 因为 $f(0) = 9 > 7$, 所以 0 不是不等式 $f(x) \leq 7$ 的解, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2^{x+1} - \frac{2}{x}$ 是单调递增函数, 因为 $f(x) \leq 7$, 所以 $2^{x+1} - \frac{2}{x} \leq 7$, 又 $f(x)$ 是定义在 \mathbf{R} 上的偶函数, 所以当 $x < 0$ 时, $f(x) \leq 7$ 的解集为 $-2 \leq x < 0$, 所以原不等式的解集为 $[-2, 0) \cup [2, +\infty)$. 故选 C.
6. A 由题意知圆 C 的圆心在直线 l 上, 且半径为 2. 因为圆 C 关于直线 l 对称, 所以直线 l 过圆心 $C(2, -a)$, 所以 $4+a-1=0$, 解得 $a=-3$, 故点 $C(2, 3)$, 所以 $|PC| = \sqrt{(2-1)^2 + [3-(-1)]^2} = 5$, 所以 $|PA| = |PB| = \sqrt{21}$, 所以 $S_{\text{四边形APBC}} = 2 \times \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{21} = 2\sqrt{21}$, 又 $S_{\text{圆C}} = \pi \times 2^2 = 4\pi$, 所以 $\frac{S_{\text{四边形APBC}}}{S_{\text{圆C}}} = \frac{2\sqrt{21}}{4\pi} = \frac{\sqrt{21}}{2\pi}$, 所以 $\frac{5}{9}|AB| = 2\sqrt{21}$, 所以 $|AB| = \frac{4\sqrt{21}}{5}$. 故选 A.
7. A 由题意知多面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台. 如图, O, O_1 分别为正方形 $ABCD$ 和 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心, 连接 PO, AC, A_1C_1 , 则 O_1 在线段 PO 上, 且 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 易证 $A_1O_1 \parallel AO, A_1B_1 \parallel AB$, 所以 $\frac{PA_1}{PA} = \frac{PO_1}{PO} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{2}{3}$. 因为 $A_1B_1 = 2, AB = 3, AA_1 = \sqrt{2}$, 所以 $PA = 3\sqrt{2}$, 又 $AO = \frac{AC}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 所以 $PO = \frac{3\sqrt{6}}{2}, OO_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 所以正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $\frac{1}{3} \times (2^2 + 3^2 + \sqrt{2^2 \times 3^2}) \times \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{19\sqrt{6}}{6}$. 故选 A.
8. B 设 $|F_1F_2| = 2c$, 连接 AB , 与 x 轴交于点 M , 由对称性可知 $|AF_1| = |BF_1|, AB \perp F_1F_2$, 又 $\angle AF_1B = 60^\circ$, 所以 $\triangle AF_1B$ 是正三角形, 且 $\angle AF_1F_2 = 30^\circ$. 因为 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} = 0$, 所以 $AF_1 \perp AF_2$, 所以 $|AF_2| = c, |AF_1| = \sqrt{3}c$, 所以 $|AB| = |AF_1| = \sqrt{3}c, |AM| = \frac{1}{2}|AF_1| = \frac{\sqrt{3}}{2}c, |OM| = \frac{c}{2}$, 所以 $A\left(\frac{1}{2}c, \frac{\sqrt{3}}{2}c\right)$, 又点 A 在直线 $y = \frac{b}{a}x$ 上, 故 $\frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{b}{a} \times \frac{1}{2}c$, 所以 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$, 所以 $e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = 2$. 故选 B.
9. AD 将原数据按从小到大的顺序排列为 12, 16, 22, 24, 25, 31, 33, 35, 45, 其中位数为 25, 平均数是 $(12+16+22+24+25+31+33+35+45) \div 9 = 27$, 方差是 $\frac{1}{9} \times [(-15)^2 + (-11)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-2)^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + 18^2] = \frac{824}{9}$, 由 $40\% \times 9 = 3.6$, 得原数据的第 40 百分位数是第 4 个数 24. 将原数据去掉 12 和 45, 得 16, 22, 24, 25, 31, 33, 35, 其中位数为 25, 平均数是 $(16+22+24+25+31+33+35) \div 7 = \frac{186}{7}$, 方差是 $\frac{1}{7} \times \left[\left(-\frac{74}{7}\right)^2 + \left(-\frac{32}{7}\right)^2 + \left(-\frac{18}{7}\right)^2 + \left(-\frac{11}{7}\right)^2 \right]$




$+ \left(\frac{31}{7}\right)^2 + \left(\frac{45}{7}\right)^2 + \left(\frac{59}{7}\right)^2 = \frac{1916}{49}$, 由 $40\% \times 7 = 2.8$, 得新数据的第 40 百分位数是第 3 个数 24, 故中位数和第 40 百分位数不变, 平均数与方差改变, 故 A, D 正确, B, C 错误. 故选 AD.

10. BCD 由题意知 $\begin{cases} A+d=1, \\ -A+d=-3, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} A=2, \\ d=-1, \end{cases}$ $f(x)$ 的最小正周期为 4π , 即 $\frac{2\pi}{\omega} = 4\pi$, 所以 $\omega = \frac{1}{2}$, 故 $f(x) = 2\sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$. 由 $x \in [0, 5\pi]$, 得 $\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{8\pi}{3}\right]$, 所以当 $\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$, 即 $x = 0, \frac{4\pi}{3}, 4\pi$ 时, $f(x) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $[0, 5\pi]$ 内恰有 3 个零点, 故 A 错误, B 正确; 由 $f(x) = 2\sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$, 得 $g(x) = 2\sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right)$, 所以 $g\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = 2\sin\left[\frac{1}{2} \times \left(-\frac{4\pi}{3}\right) - \frac{\pi}{3}\right] = 0$, 故 C 正确; 由 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 得 $\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{11\pi}{24}, \frac{\pi}{12}\right] \subseteq \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上单调递增, 故 D 正确. 故选 BCD.

11. BC 由抛物线的定义知, $|QF| = \frac{p}{2} + 1 = 2$, 所以 $p = 2$, 故 C 的方程为 $y^2 = 4x$, 所以 C 的准线方程为 $x = -1$, 故 A 错误; 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 又 $F(1, 0), A(2, 0)$, 所以 $|MF| = 1 + x_1, |MA|^2 = (x_1 - 2)^2 + y_1^2 = x_1^2 - 4x_1 + 4 + 4x_1 = x_1^2 + 4$, 所以 $\frac{|MA|^2}{|MF| - 1} = \frac{x_1^2 + 4}{x_1} = x_1 + \frac{4}{x_1} \geq 2\sqrt{x_1 \cdot \frac{4}{x_1}} = 4$, 当且仅当 $x_1 = \frac{4}{x_1}$, 即 $x_1 = 2$ 时, 等号成立, 故 $\frac{|MA|^2}{|MF| - 1}$ 的最小值为 4, 故 B 正确; 设直线 MN 的方程为 $x = my + 1$, 联立 $\begin{cases} x = my + 1, \\ y^2 = 4x, \end{cases}$ 消去 x 并整理, 得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, 所以 $\Delta = 16m^2 + 16 > 0, y_1 y_2 = -4$, 因为 $M(2, 2\sqrt{2})$, 易求得 $N\left(\frac{1}{2}, -\sqrt{2}\right)$, 所以 $\triangle OMN$ 的面积 $S = \frac{1}{2} |OF| |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \times 1 \times \left|2\sqrt{2} - (-\sqrt{2})\right| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 故 D 错误; 由 $\begin{cases} x = my + 1, \\ y^2 = 4x, \end{cases}$ 可得 $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = 4m^2 + 2, x_1 x_2 = \frac{(y_1 y_2)^2}{16} = 1$, 又 $|MF| = 1 + x_1, |NF| = 1 + x_2$, 所以 $\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} = \frac{1+x_2 + 1+x_1}{(1+x_1)(1+x_2)} = \frac{2+x_1+x_2}{1+x_1+x_2+x_1 x_2} = \frac{2+4m^2+2}{1+4m^2+2+1} = \frac{4m^2+4}{4m^2+3} = \frac{4}{3} + \frac{4m^2}{4m^2+3} > \frac{4}{3}$, 故 D 错误. 故选 BC.

12. ACD 对于 A, 由题意得 $AB^2 + BC^2 = AC^2, AD^2 + CD^2 = AC^2$, 所以 $\angle ADC = \angle ABC = 90^\circ$, 分别过 B, D 作 AC 的垂线, 垂足分别为 E, F, 则 $BE = FD = \frac{\sqrt{3}}{2}, EF = 1$, 且 $\vec{BD} = \vec{BE} + \vec{EF} + \vec{FD}$, 因为平面 DAC \perp 平面 ABC, 易证 $BE \perp FD$, 所以 $|\vec{BD}|^2 = (\vec{BE} + \vec{EF} + \vec{FD})^2 = \vec{BE}^2 + \vec{EF}^2 + \vec{FD}^2 + 2\vec{BE} \cdot \vec{EF} + 2\vec{EF} \cdot \vec{FD} + 2\vec{FD} \cdot \vec{BE} = \frac{3}{4} + 1 + \frac{3}{4} + 0 + 0 + 0 = \frac{5}{2}$, 所以 $BD = \frac{\sqrt{10}}{2}$, 故 A 正确; 对于 B, 因为 $\angle ADC = \angle ABC = 90^\circ$, 故 AC 的中点到 A, B, C, D 的距离相等, 故球心 O 为 AC 的中点, 且球 O 的半径为 1, 故球 O 的表面积为 4π , 为定值, 故 B 错误; 对于 C, 假设 $AB \perp CD$, 又 $AB \perp BC, BC \cap CD = C, BC, CD \subset$ 平面 BCD, 所以 $AB \perp$ 平面 BCD, 又 $BD \subset$ 平面 BCD, 所以 $AB \perp BD$, 所以 $\triangle ABD$ 是以 AD 为斜边的直角三角形, 所以 $AD > AB$, 与已知矛盾, 所以异面直线 AB 与 CD 不可能垂直, 故 C 正确; 对于 D, 设 AD 与平面 ABC 所成角为 θ , 点 D 到平面 ABC 的距离为 d , 则 $\sin \theta = \frac{d}{AD} = d$, 所以当点 D 到平面 ABC 的距离最大时, AD 与平面 ABC 所成角最大, 当平面 DAC \perp 平面 ABC 时, 点 D 到平面 ABC 的距离最大, 此时 $d_{\max} = DF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $(\sin \theta)_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\theta_{\max} = 60^\circ$, 故 D 正确. 故选 ACD.



13. 18 因为 $T_{r+1} = C_n^r (\sqrt{x})^{n-r} (-\frac{1}{x})^r = (-1)^r C_n^r x^{\frac{n-3r}{2}}$, 且 $r=6$ 时为常数项, 故 $n-3 \times 6 = 0$, 所以 $n = 18$.

14. $-\frac{23}{25}$ 因为 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{3}{5}, \cos \alpha \cos \beta = \frac{2}{5}$, 所以 $\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{5}$, 所以 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{5}$, 所以 $\cos(2\alpha - 2\beta) = \cos 2(\alpha - \beta) = 2\cos^2(\alpha - \beta) - 1 = -\frac{23}{25}$.

XKB

【高三核心模拟卷(中)·数学(一) 参考答案 第 2 页(共 6 页)】

15. \sqrt{n} (2分) $\frac{44}{45}$ (3分) 由题意知, $OA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = \dots = A_7A_8 = 1$, 且 $\triangle OA_1A_2, \triangle OA_2A_3, \dots, \triangle OA_7A_8$ 都是直角三角形, 所以 $a_1 = 1$, 且 $a_n^2 = a_{n-1}^2 + 1$, 所以数列 $\{a_n^2\}$ 是以 1 为首项, 1 为公差的等差数列, 所以 $a_n^2 = 1 + (n-1) \times 1 = n$, 又 $a_n > 0$, 所以 $a_n = \sqrt{n}$. 由 $b_n = \frac{1}{(n+1)a_n + na_{n+1}}$, 得 $b_n = \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+n} + \sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$, 所以 $S_{2024} = \left(\frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{2024}} - \frac{1}{\sqrt{2025}}\right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2025}} = 1 - \frac{1}{45} = \frac{44}{45}$.

16. $(-\infty, 2\sqrt{e} + \ln 2]$ 因为关于 x 的不等式 $2e^x - 2x \ln x - m > 0$ 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上恒成立, 即 $\frac{m}{2} < e^x - x \ln x$ 在 $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ 上恒成立. 令 $f(x) = e^x - x \ln x$, 则 $f'(x) = e^x - \ln x - 1$, 令 $g(x) = e^x - \ln x - 1$, 则 $g'(x) = e^x - \frac{1}{x}$, 易得 $g'(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 又 $g'(\frac{1}{2}) = \sqrt{e} - 2 < 0, g'(1) = e - 1 > 0$, 所以存在 $x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $g'(x_0) = 0$, 即 $e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 则 $x_0 = -\ln x_0$, 所以当 $x \in (\frac{1}{2}, x_0)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g(x)_{\min} = g(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 1 = \frac{1}{x_0} + x_0 - 1 > 2 - 1 = 1 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$ 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $f(x)$ 在区间 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $\frac{m}{2} \leq f(\frac{1}{2}) = \sqrt{e} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \sqrt{e} + \frac{1}{2} \ln 2$, 所以 $m \leq 2\sqrt{e} + \ln 2$, 即实数 m 的取值范围是 $(-\infty, 2\sqrt{e} + \ln 2]$.

17. 解: (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 因为 $\angle C = 2\angle B$, 由正弦定理得 $\sin C = 2\sin B$, 1分
又 $\sin C = 2\sin B$, 所以 $\sin C = \sin 2B$, 2分
所以 $\sin C = 2\sin C \cos C$, 3分
因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $\sin C \neq 0$, 所以 $\cos C = \frac{1}{2}$.

解得 $C = \frac{\pi}{3}$ 5分

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 4, c = 8$, 6分

由余弦定理得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 即 $64 = a^2 + 16 - 4a$, 7分

即 $a^2 - 4a - 48 = 0$, 解得 $a = 2 + 2\sqrt{13}$ 或 $a = 2 - 2\sqrt{13}$ (舍去), 9分

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times (2 + 2\sqrt{13}) \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} + 2\sqrt{39}$ 10分

18. 解: (1) 由频率分布直方图可知, 样本中成绩不低于 110 分的学生占 $20 \times (0.005 + 0.0125) \times 100\% = 35\%$, 2分

所以若参与测试的学生共 12 000 人, 估计成绩不低于 110 分的学生有 $12\ 000 \times 35\% = 4\ 200$ 人. 4分

(2) 由频率分布直方图可知, $20 \times (0.005 + 0.0075 + 0.010 + 0.0125 + m) = 1$, 5分

解得 $m = 0.0150$ 5分

若用分层随机抽样的方法从样本中的 $[90, 110)$ 和 $[130, 150]$ 两组抽取 8 人, 则来自 $[90, 110)$ 组的有 6 人, 来自 $[130, 150]$ 组的有 2 人.

所以 X 的所有可能取值为 1, 2, 3, 6分

则 $P(X=1) = \frac{C_4^1 C_2^7}{C_8^8} = \frac{3}{28}, P(X=2) = \frac{C_4^2 C_2^6}{C_8^8} = \frac{15}{28}, P(X=3) = \frac{C_4^3 C_2^5}{C_8^8} = \frac{5}{14}$, 8分

所以 X 的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{5}{14}$

..... 10分

所以 $E(X) = 1 \times \frac{3}{28} + 2 \times \frac{15}{28} + 3 \times \frac{5}{14} = \frac{9}{4}$ 12分

19. (1) 证明: 取 AB 的中点 O , 连接 OC, OP, OB_1 , 则 $OC \perp AB, OP \perp AB$.

因为在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 ABC , 平面 $ABB_1A_1 \cap$ 平面 $ABC = AB$,

且 $OC \subset$ 平面 ABC , 所以 $OC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 2分

又 $BP \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $OC \perp BP$ 3分

因为 $BB_1 = PB_1 = OB = 1, BB_1 \perp AB, BB_1 \perp PB_1$,

所以四边形 OBB_1P 为正方形, 所以 $BP \perp OB_1$ 4分

又 $OB_1 \cap OC = O, OB_1, OC \subset$ 平面 OB_1C , 所以 $BP \perp$ 平面 OB_1C .

又 $B_1C \subset$ 平面 OB_1C , 所以 $BP \perp B_1C$ 5分

(2) 解: 由(1)知 OA, OP, OC 两两垂直, 故以 O 为坐标原点, 以 OA, OP, OC 所在直线


分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $O(0, 0, 0)$,

$B(-1, 0, 0), P(0, 1, 0), B_1(-1, 1, 0), A(1, 0, 0), C(0, 0, \sqrt{3})$, 所以 $\vec{AC} =$

$(-1, 0, \sqrt{3}), \vec{B_1P} = (1, 0, 0), \vec{OA} = (1, 0, 0)$ 6分

由 $\frac{AQ}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $\vec{AQ} = \frac{\sqrt{3}}{3} \vec{AC} = (-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0, 1)$, 所以 $\vec{OQ} = \vec{OA} + \vec{AQ} = (1 - \frac{\sqrt{3}}{3}, 0, 1)$,

所以 $Q(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}, 0, 1)$, 所以 $\vec{PQ} = (1 - \frac{\sqrt{3}}{3}, -1, 1)$ 8分



设平面 PQB_1 的一个法向量 $n = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{B_1P} \cdot n = x = 0, \\ \vec{PQ} \cdot n = (1 - \frac{\sqrt{3}}{3})x - y + z = 0, \end{cases}$

取 $x = 0, z = 1$, 所以 $n = (0, 1, 1)$ 10分

易知平面 BPB_1 的一个法向量为 $m = (0, 0, 1)$,

设平面 PQB_1 与平面 BPB_1 的夹角为 θ .

所以 $\cos \theta = |\cos \langle n, m \rangle| = \frac{|n \cdot m|}{|n| |m|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

所以平面 PQB_1 与平面 BPB_1 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 12分

20. 解: (1) 由 $S_n = \frac{a_n^2 + a_n}{2}$, 得 $2S_n = a_n^2 + a_n$,

当 $n=1$ 时, $2S_1 = a_1^2 + a_1$, 即 $2a_1 = a_1^2 + a_1$, 又 $a_1 > 0$, 所以 $a_1 = 1$ 1分

当 $n \geq 2$ 时, $2S_{n-1} = a_{n-1}^2 + a_{n-1}$,

所以 $2S_n - 2S_{n-1} = a_n^2 + a_n - a_{n-1}^2 - a_{n-1}$, 即 $2a_n = a_n^2 + a_n - a_{n-1}^2 - a_{n-1}$,

整理得 $(a_n + a_{n-1})(a_n - a_{n-1} - 1) = 0$,

因为 $a_n > 0$, 所以 $a_n - a_{n-1} = 1$ 3分

所以数列 $\{a_n\}$ 是以 1 为首项, 1 为公差的等差数列, 所以 $a_n = 1 + n - 1 = n$ 4分

(2) 由(1)得 $b_n = \begin{cases} n, n \text{ 为奇数}, \\ n \cdot 2^n, n \text{ 为偶数}, \end{cases}$ 5分

当 n 为偶数时, $T_n = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \dots + b_{n-1} + b_n$

$= 1 + 2 \times 2^2 + 3 + 4 \times 2^4 + \dots + (n-1) + n \cdot 2^n$

$= \underbrace{[1 + 3 + \dots + (n-1)]}_{\frac{n}{2} \text{项}} + \underbrace{(2 \times 2^2 + 4 \times 2^4 + \dots + n \cdot 2^n)}_{\frac{n}{2} \text{项}}$, 6分

令 $A = \underbrace{1 + 3 + \dots + (n-1)}_{\frac{n}{2} \text{项}}$, 则 $A = \frac{\frac{n}{2}(1+n-1)}{2} = \frac{n^2}{4}$, 7分

令 $B = \underbrace{2 \times 2^2 + 4 \times 2^4 + \dots + n \cdot 2^n}_{\frac{n}{2} \text{项}}$, 所以 $4B = \underbrace{2 \times 2^4 + 4 \times 2^6 + \dots + n \cdot 2^{n+2}}_{\frac{n}{2} \text{项}}$,

两式相减, 得 $-3B = \underbrace{8 + 2 \times 2^4 + 2 \times 2^6 + \dots + 2 \times 2^n - n \cdot 2^{n+2}}_{\frac{n}{2} + 1 \text{项}}$

$$= 8 + \frac{2^5(1-2^{n-2})}{1-4} - n \times 2^{n+2} = 8 + \frac{2^{n+3}-32}{3} - n \times 2^{n+2} = -\frac{8}{3} - \frac{3n-2}{3} \times 2^{n+2},$$

所以 $B = \frac{8}{9} + \frac{3n-2}{9} \times 2^{n+2}$, 9分

所以 $T_n = \frac{n^2}{4} + \frac{8}{9} + \frac{3n-2}{9} \times 2^{n+2}$;

当 n 为奇数时, $T_n = T_{n+1} - b_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{4} + \frac{8}{9} + \frac{3n+1}{9} \times 2^{n+3} - (n+1) \times 2^{n+1}$
 $= \frac{(n+1)^2}{4} + \frac{8}{9} + \left[\frac{4(3n+1)}{9} - n - 1 \right] \times 2^{n+1} = \frac{(n+1)^2}{4} + \frac{8}{9} + \frac{3n-5}{9} \times 2^{n+1}$, 11分

所以 $T_n = \begin{cases} \frac{n^2}{4} + \frac{8}{9} + \frac{3n-2}{9} \times 2^{n+2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{(n+1)^2}{4} + \frac{8}{9} + \frac{3n-5}{9} \times 2^{n+1}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$ 12分

21. 解: (1) 设 C 的焦距为 $2c (c > 0)$, 则 $l_1: x = -c$, 代入椭圆 C 的方程,

得 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 解得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 所以 $P(-c, \frac{b^2}{a}), Q(-c, -\frac{b^2}{a})$ 1分

由 $S_{\text{四边形}PA_1QA_2} = \frac{1}{2} \times 2a \times \frac{2b^2}{a} = 2b^2 = 10$, 得 $b^2 = 5$, 2分

由 $S_{\triangle POF_2} = \frac{1}{2} \times 2c \times \frac{2b^2}{a} = \frac{10c}{a} = \frac{20}{3}$, 得 $\frac{c}{a} = \frac{2}{3}$, 3分

又 $a^2 - c^2 = b^2 = 5$, 所以 $a = 3, c = 2$,

所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 4分

(2) 由 (1) 知, $P(-2, \frac{5}{3}), Q(-2, -\frac{5}{3})$. 假设存在直线 l_2 , 使得 $\frac{S_{\triangle ANP}}{S_{\triangle AMA_2}} = \frac{1}{2}$.

若 l_2 不存在斜率, 则 $M(0, -\frac{1}{2}), N(0, \frac{1}{2})$, 故 $\frac{1}{2} \times (\sqrt{5}-1) \times 2 = \sqrt{5}-1$,

$S_{\triangle AMA_2} = \frac{1}{2} \times (\sqrt{5}+1) \times 3 = \frac{3(\sqrt{5}+1)}{2}$, $\frac{S_{\triangle ANP}}{S_{\triangle AMA_2}} \neq \frac{1}{2}$, 不合题意; 5分

若 l_2 存在斜率, 设 l_2 的方程为 $y = kx + 1$,

直线 PA_2 的方程为 $y = -\frac{1}{3}(x-3) = -\frac{1}{3}x + 1$, 所以直线 PA_2 过点 $A(0, 1)$,

所以 $\frac{|AP|}{|AA_2|} = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$, 6分

所以 $\frac{S_{\triangle ANP}}{S_{\triangle AMA_2}} = \frac{\frac{1}{2} |AP| \cdot |AN| \cdot \sin \angle PAN}{\frac{1}{2} |AA_2| \cdot |AM| \cdot \sin \angle A_2AM} = \frac{2 |AN|}{3 |AM|} = \frac{1}{2}$, 所以 $3 |AM| = 4 |AN|$,

所以 $\vec{AM} = -\frac{4}{3} \vec{AN}$, 7分

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $\vec{AM} = (x_1, y_1 - 1), \vec{AN} = (x_2, y_2 - 1)$,

所以 $x_1 = -\frac{4}{3}x_2$, 8分

联立 $\begin{cases} y = kx + 1, \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1, \end{cases}$ 消去 y 并整理得 $(9k^2 + 5)x^2 + 18kx - 36 = 0$,

则 $\Delta > 0, x_1 + x_2 = -\frac{18k}{9k^2 + 5}, x_1 x_2 = -\frac{36}{9k^2 + 5}$, 9分

又 $x_1 = -\frac{4}{3}x_2$, 所以 $x_2 = \frac{54k}{9k^2 + 5}, x_2^2 = \frac{27}{9k^2 + 5}$,

所以 $(\frac{54k}{9k^2 + 5})^2 = \frac{27}{9k^2 + 5}$, 解得 $k = \pm \frac{\sqrt{55}}{33}$, 11分

所以 l_2 的方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{55}}{33}x + 1$.

故存在直线 l_2 , 使得 $\frac{S_{\triangle ANP}}{S_{\triangle AM_2A_2}} = \frac{1}{2}$, 且直线 l_2 的方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{55}}{33}x + 1$ 12分

22. 解: (1) 由题意得 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$, 1分

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$,

故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 2分

所以 $f(x)_{\min} = f(1) = 0$ 3分

$$(2) g(x) = x^2[f(x) + 1 - a] - x + a = x^2\left(\ln x + \frac{a}{x^2} - a\right),$$

$$\text{令 } \varphi(x) = \ln x + \frac{a}{x^2} - a, \text{ 则 } g(x) = x^2\varphi(x),$$

因为 $g(x) = x^2\varphi(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 故 $y = g(x)$ 的零点与 $y = \varphi(x)$ 的零点相同,

所以下面研究函数 $y = \varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点个数.

$$\text{由 } \varphi(x) = \ln x + \frac{a}{x^2} - a, \text{ 得 } \varphi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2a}{x^3} = \frac{x^2 - 2a}{x^3}. \text{ 5分}$$

当 $a \leq 0$ 时, $\varphi'(x) > 0$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $\varphi(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上单调递增.

又 $\varphi(1) = 0$, 故此时 $\varphi(x)$ 有唯一零点, 6分

$$\text{当 } a > 0 \text{ 时, } \varphi'(x) = \frac{x^2 - 2a}{x^3} = \frac{(x - \sqrt{2a})(x + \sqrt{2a})}{x^3} \quad (x > 0),$$

$$\text{令 } \varphi'(x) < 0 \quad (x > 0), \text{ 得 } 0 < x < \sqrt{2a}, \text{ 令 } \varphi'(x) > 0 \quad (x > 0), \text{ 得 } x > \sqrt{2a},$$

所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, \sqrt{2a})$ 上单调递减, 在 $(\sqrt{2a}, +\infty)$ 上单调递增,

且 $\varphi(\sqrt{2a}) = \ln \sqrt{2a} + \frac{a}{2a} - a = \frac{1}{2} \ln 2a - \frac{1}{2} - a$ 7分

$$\text{令 } m(t) = \frac{1}{2} \ln 2a - \frac{1}{2} - a, \text{ 则 } \varphi(\sqrt{2a}) = m\left(\frac{1}{\sqrt{2a}}\right),$$

易得 $m(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

又 $m(1) = 0$, 所以当 $t \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 时, $m(t) < 0$ 8分

① 当 $\sqrt{2a} = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}$ 时, $\varphi(x)_{\min} = \varphi(1) = 0$, 此时 $\varphi(x)$ 有唯一零点 $x = 1$ 9分

② 当 $0 < \sqrt{2a} < 1$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 且 $\varphi(\sqrt{2a}) < 0$.

因为 $\varphi(1) = 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(\sqrt{2a}, +\infty)$ 上有唯一的零点 $x = 1$.

$$\varphi\left(\frac{a}{1-a}\right) = \ln \frac{a}{1-a} + a \left[\frac{(1-a)^2}{a^2} - 1 \right] = \ln \frac{a}{1-a} + \frac{1}{a} - 2,$$

$$\text{令 } \frac{a}{1-a} = k \quad (k < 1), \text{ 则 } a = \frac{k}{1+k},$$

$$\text{所以 } \varphi(k) = \ln k + \frac{1}{k} - 1 = f(k), \text{ 由(1)知, } \varphi(k) > 0, \text{ 又 } \varphi(\sqrt{2a}) < 0,$$

所以 $\varphi(x)$ 在 $\left[\frac{a}{1-a}, \sqrt{2a}\right)$ 上存在唯一零点, 不妨设 $x = x_1$,

所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, \sqrt{2a})$ 上有唯一的零点 $x = x_1$,

故 $\varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个零点; 10分

③ 当 $\sqrt{2a} > 1$, 即 $a > \frac{1}{2}$ 时, 且 $\varphi(\sqrt{2a}) < 0, \varphi(1) = 0, e^{\frac{1}{2}} > 1, \varphi(e^{\frac{1}{2}}) = \frac{a}{e^{\frac{1}{2}}} > 0$,

由函数零点存在定理可得 $y = \varphi(x)$ 在 $(\sqrt{2a}, e^{\frac{1}{2}})$ 上有唯一零点,

故 $\varphi(x)$ 在 $(0, \sqrt{2a}), (\sqrt{2a}, +\infty)$ 上各有一个唯一零点. 11分

综上, 当 $a \leq 0$ 或 $a = \frac{1}{2}$ 时, 函数 $g(x)$ 有唯一零点; 当 $a > 0$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$ 时, 函数 $g(x)$ 有两个零点. 12分

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址: www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。

